
Logik Teil 3: Mehr zur Prädikatenlogik erster Stufe

Übersicht Teil 3

- Kapitel 3.1: Sequenzenkalkül
- Kapitel 3.2: Rekursive Aufzählbarkeit, Kompaktheit und Löwenheim-Skolem
- Kapitel 3.3: Ausdrucksstärke /
Grundlagen von Ehrenfeucht-Fraïsse Spielen
- Kapitel 3.4: Ehrenfeucht-Fraïsse Spiele: Anwendungen

Mehr zur Prädikatenlogik

Kapitel 3.1: Sequenzenkalkül

Sequenzenkalkül

Wir betrachten ein Kalkül für Gültigkeit in der Prädikatenlogik

Motivation:

- rekursive Aufzählbarkeit nachweisen
- einfacher Beweis für das Kompaktheitstheorem in FO

Im Prinzip könnten wir wieder Resolution verwenden
(Grundlage für Theorembeweiser der Logik erster Stufe)

Wir verwenden aber einen technisch einfacheren Ansatz:

Gentzens Sequenzenkalkül

Der Einfachheit halber verzichten wir auf das Gleichheitsprädikat

Sequenz

Definition Sequenz

Eine *Sequenz* ist ein Ausdruck der Form $\Gamma \Rightarrow \Delta$ wobei Γ und Δ endliche Mengen von Sätzen sind. Wir nennen

- Γ das *Antezedenz* und
- Δ das *Sukzedenz*.

Die Sequenz $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ist *gültig* wenn $\bigwedge \Gamma \models \bigvee \Delta$, in Worten:

jedes Modell von $\bigwedge \Gamma$ macht auch mindestens einen Satz aus Δ wahr

Ist eine Sequenz $\Gamma \Rightarrow \Delta$ gültig, so schreiben wir $\models \Gamma \Rightarrow \Delta$.

Beispiele für gültige Sequenzen:

- $\{\forall x P(x), Q(c)\} \Rightarrow \{P(c) \wedge Q(c), R(c, d)\}$
- $\{P(c) \vee Q(d)\} \Rightarrow \{P(c), Q(d)\}$

Sequenzenkalkül

Das Sequenzenkalkül erlaubt, alle gültigen Sequenzen abzuleiten

Offensichtlich:

- FO-Satz φ ist Tautologie gdw. die Sequenz $\emptyset \Rightarrow \{\varphi\}$ gültig ist
- FO-Satz φ ist unerfüllbar gdw. die Sequenz $\{\varphi\} \Rightarrow \emptyset$ gültig ist
(denn $\bigvee \emptyset$ ist unerfüllbar)

Man kann das Sequenzenkalkül also auch als Kalkül zum Ableiten aller Tautologien/unerfüllbaren *Formeln* ansehen.

Sequenzkalkül

Die zentralen Bestandteile des SK:

- Axiome

Sequenzen, die man ohne Beweis / Herleitung als gültig voraussetzt

- Schlussregeln

Im Gegensatz zu Resolution/Hilbert hat das SK recht viele davon:

2 Stück pro Operator \neg , \wedge , \vee , \forall , \exists ,

jeweils für die linke und die rechte Seite von Sequenzen

(positive und negative Form der Regel)

Sequenzkalkül

Zum Hervorheben von Formeln in Sequenzen schreiben wir

$$\Gamma, \varphi \Rightarrow \Delta, \psi \text{ statt } \Gamma \cup \{\varphi\} \Rightarrow \Delta \cup \{\psi\}$$

Definition Axiome SK

Die *Axiome* des Sequenzkalküls (SK) sind alle Sequenzen der Form

$$\Gamma, \varphi \Rightarrow \Delta, \varphi.$$

Axiome sind offensichtlich gültige Sequenzen

Sequenzenkalkül

$$(\neg \Rightarrow) \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}{\Gamma, \neg \varphi \Rightarrow \Delta}$$

$$(\Rightarrow \neg) \frac{\Gamma, \varphi \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \neg \varphi}$$

$$(\vee \Rightarrow) \frac{\Gamma, \varphi \Rightarrow \Delta \quad \Gamma, \psi \Rightarrow \Delta}{\Gamma, \varphi \vee \psi \Rightarrow \Delta}$$

$$(\Rightarrow \vee) \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi}$$

$$(\wedge \Rightarrow) \frac{\Gamma, \varphi, \psi \Rightarrow \Delta}{\Gamma, \varphi \wedge \psi \Rightarrow \Delta}$$

$$(\Rightarrow \wedge) \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi}$$

$$(\exists \Rightarrow) \frac{\Gamma, \varphi[c] \Rightarrow \Delta}{\Gamma, \exists x \varphi(x) \Rightarrow \Delta} \quad \begin{array}{l} c \text{ nicht in} \\ \Gamma, \Delta, \varphi(x) \end{array}$$

$$(\Rightarrow \exists) \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi[t]}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x \varphi(x)}$$

$$(\forall \Rightarrow) \frac{\Gamma, \varphi[t] \Rightarrow \Delta}{\Gamma, \forall x \varphi(x) \Rightarrow \Delta}$$

$$(\Rightarrow \forall) \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi[c]}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x \varphi(x)} \quad \begin{array}{l} c \text{ nicht in} \\ \Gamma, \Delta, \varphi(x) \end{array}$$



Definition ableitbar

Die Menge der *ableitbaren* Sequenzen ist die kleinste Menge von Sequenzen, die

- alle Axiome des SK enthält und
- abgeschlossen ist unter Regelanwendung: wenn Instanzen der Sequenzen in der oberen Zeile einer Schlussregel enthalten sind, so auch die entsprechende Instanz der unteren Zeile

Ist eine Sequenz $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ableitbar, so schreiben wir $\vdash \Gamma \Rightarrow \Delta$.

Instanz bedeutet: $\Gamma, \Delta, \varphi, \psi$ durch konkrete Formeln/Formelmengen ersetzen

Beispiel



Definition SK-Beweis

Ein *SK-Beweis* ist ein Baum, dessen Knoten auf folgende Weise mit Sequenzen beschriftet sind:

- Jedes Blatt ist mit einem Axiom beschriftet
- Jeder innere Knoten ist mit einer Instanz der unteren Zeile einer Schlussregel beschriftet
- die Kinder dieses Knotens sind dann genau mit den entsprechenden Instanzen der Sequenzen in der oberen Zeile der Regel beschriftet.

Beachte:

- jeder innere Knoten hat ein oder zwei Kinder
- eine Sequenz ist ableitbar gdw. sie als Knotenbeschriftung in einem SK-Beweis auftritt.

Beispiel



Sequenzkalkül

Zur Erinnerung:

In der Sequenz Γ, φ darf Γ auch φ enthalten, muss aber nicht

Darum darf man bei Anwendung von $(\Rightarrow \exists)$ und $(\forall \Rightarrow)$ im SK-Beweis die verwendete Teilformel “behalten”:

Beispiel $(\forall \Rightarrow)$:
$$(\forall \Rightarrow) \frac{\Gamma, \varphi[t] \Rightarrow \Delta}{\Gamma, \forall x \varphi(x) \Rightarrow \Delta}$$

$$\frac{P(c) \Rightarrow P(c) \wedge P(d)}{\forall x P(x) \Rightarrow P(c) \wedge P(d)}$$

$$\frac{\forall x P(x), P(c) \Rightarrow P(c) \wedge P(d)}{\forall x P(x) \Rightarrow P(c) \wedge P(d)}$$

Das gilt im Prinzip für alle Regeln, ist aber nur bei $(\Rightarrow \exists)$ und $(\forall \Rightarrow)$ nützlich (und notwendig!)

Theorem (Korrektheit SK)

Wenn $\vdash \Gamma \Rightarrow \Delta$, dann $\models \Gamma \Rightarrow \Delta$ (jede ableitbare Sequenz ist gültig).

Beweis:

Es reicht, zu zeigen:

1. alle SK-Axiome sind gültig

offensichtlich gilt $\bigwedge \Gamma \models \bigvee \Delta$ wenn es $\varphi \in \Gamma \cap \Delta$ gibt

2. wenn eine Sequenz $\Gamma \Rightarrow \Delta$ durch das Anwenden einer Schlussregel auf gültige Sequenzen entsteht, dann ist $\Gamma \Rightarrow \Delta$ gültig.

Fallunterscheidung: ein Fall pro Regel.



Vollständigkeit

Theorem (Vollständigkeit SK)

Wenn $\models \Gamma \Rightarrow \Delta$, dann $\vdash \Gamma \Rightarrow \Delta$ (jede gültige Sequenz ist ableitbar).

Beweisstrategie:

(Details im Grädel-Skript)

Man beweist das Kontrapositiv:

wenn $\Gamma \Rightarrow \Delta$ **nicht** ableitbar, dann $\Gamma \Rightarrow \Delta$ **nicht** gültig, also $\wedge \Gamma \not\models \vee \Delta$.

Also zu zeigen: es gibt Modell \mathfrak{A} für $\Gamma \cup \neg\Delta$, wobei $\neg\Delta = \{\neg\varphi \mid \varphi \in \Delta\}$

Im Prinzip möchten wir \mathfrak{A} einfach aus Γ "ablesen",

die nicht-Ableitbarkeit von $\Gamma \Rightarrow \Delta$ soll sicherstellen, dass $\mathfrak{A} \models \neg\Delta$

Vollständigkeit

Theorem (Vollständigkeit SK)

Wenn $\models \Gamma \Rightarrow \Delta$, dann $\vdash \Gamma \Rightarrow \Delta$ (jede gültige Sequenz ist ableitbar).

“ \mathfrak{A} aus Γ ablesen”: wenn z.B.

$$\Gamma = \{Q_1(c), \neg Q_2(c), \exists x P(x), P(c)\} \quad \Delta = \{Q_2(c), \neg P(c)\}$$

dann ist klar, wie \mathfrak{A} aus Γ abgelesen wird und dass $\mathfrak{A} \not\models \Delta$.

Das geht aber nicht immer so einfach:

$$\Gamma = \{Q_1(c) \vee Q_2(c), \exists x P(x)\} \quad \Delta = \{\dots\}$$

Man muss darum Γ und Δ erst vervollständigen. ●

Für später: das konstruierte Modell ist *höchstens abzählbar unendlich*.

Kapitel 3.2: Rekursive Aufzählbarkeit, Kompaktheit und Löwenheim-Skolem

Rekursive Aufzählbarkeit

Theorem (Rekursive Aufzählbarkeit)

Für jede rekursiv aufzählbare Signatur τ sind rekursiv aufzählbar:

- die Menge aller Tautologien aus $FO(\tau)$
- die Menge aller unerfüllbaren Sätze aus $FO(\tau)$

Beweis:

- die Menge aller Sätze über Signatur τ ist rekursiv aufzählbar, also auch die Menge aller SK-Beweise
- FO Satz φ ist
 - Tautologie gdw. es SK-Beweis für $\emptyset \Rightarrow \{\varphi\}$ gibt,
 - unerfüllbar gdw. es SK-Beweis für $\{\varphi\} \Rightarrow \emptyset$ gibt

(Korrektheit und Vollständigkeit des SK)

Beachte: entscheidend ist hier die *Endlichkeit* von SK-Beweisen

Rekursive Aufzählbarkeit

Korollar

Wenn τ mind. ein binäres Relationssymbol enthält, ist die Menge der erfüllbaren $\text{FO}(\tau)$ -Formeln nicht rekursiv aufzählbar.

Denn: Wären die erfüllbaren Formeln rekursiv aufzählbar, so wäre Erfüllbarkeit entscheidbar:

Um Erfüllbarkeit von φ zu prüfen, zähle simultan die erfüllbaren Formeln und die unerfüllbaren Formeln auf:

erfüllbar

φ_1

φ_2

\vdots

unerfüllbar

ψ_1

ψ_2

\vdots

Nach endlicher Zeit findet man Eingabeformel φ .

Rekursive Aufzählbarkeit

Über endlichen Strukturen kehrt sich die Situation um:

Theorem (Rekursive Aufzählbarkeit, endliche Modelle)

Über endlichen Modellen gilt:

1. die Menge der erfüllbaren Formeln ist rekursiv aufzählbar, für jede aufzählbare Signatur τ
2. die Menge der unerfüllbaren Formeln ist nicht rekursiv aufzählbar, ebensowenig die Menge der Tautologien

Beweis in der Übung.

Theorembeweiser

Rekursive Aufzählbarkeit liefert *Semi-Entscheidbarkeit* für Gültigkeit (und Unerfüllbarkeit):

- wenn Eingabe Tautologie, dann terminiert der Algorithmus nach endlicher Zeit und antwortet “gültig”;
- wenn Eingabe keine Tautologie, dann keine Terminierung.

Auf diesem Prinzip beruhen moderne Theorembeweiser wie Vampire, Paradox, Spass; allerdings wird...

- meist Resolution verwendet (mit aufwendigen Optimierungstechniken)
- durch zusätzliche Verfahren in “vielen Fällen” auch Terminierung auf nicht-Tautologien erreicht

Theorembeweiser

Beachte:

wenn eine FO-Theorie Γ eine endliche Axiomatisierung Π hat,
dann kann ein Theorembeweiser auch für Γ verwendet werden:

$$\varphi \in \Gamma \text{ gdw. } \bigwedge \Pi \rightarrow \varphi \text{ Tautologie}$$

Auch auf unendliche Axiomatisierungen können viele Beweiser
angepasst werden

Man kann sie aber nicht verwenden, um Goldbachs Vermutung
(oder andere zahlentheoretische Resultate) zu beweisen, denn

$$\text{Th}(\mathbb{N}, +, *, 0, 1)$$

ist ja nicht axiomatisierbar.

Kompaktheit

Der Kompaktheitssatz für FO ist wie in der Aussagenlogik formuliert:

Theorem (Kompaktheitssatz)

Für alle Mengen von Sätzen $\Gamma \subseteq \text{FO}$ und Sätze $\varphi \in \text{FO}$ gilt:

1. Γ ist erfüllbar gdw. jede endliche Teilmenge von Γ erfüllbar ist
2. $\Gamma \models \varphi$ gdw. endliches $\Delta \subseteq \Gamma$ existiert mit $\Delta \models \varphi$

Dieser Satz hat verschiedene wichtige Anwendungen:

- Nicht-Ausdrückbarkeitsbeweise von Eigenschaften in FO
- fundamentale modelltheoretische Resultate wie die Sätze von Löwenheim-Skolem

Sein Beweis verwendet eine Variation des Sequenzenkalküls

Erweitertes Sequenzenkalkül

Beweis von Kompaktheit erfordert Variation des Sequenzenkalküls:

Anstatt für die Gültigkeit von Sequenzen ($\models \Pi \Rightarrow \Delta$) interessiert man sich nun für die Folgerbarkeit von Sequenzen aus einer (eventuell unendlichen) Formelmenge Γ :

$$\Gamma \models \Pi \Rightarrow \Delta \text{ steht für } \Gamma \models \bigwedge \Pi \rightarrow \bigvee \Delta$$

Für eine Menge von Sätzen $\Gamma \subseteq \text{FO}$ erhält man die Γ -*Erweiterung* des SK durch Hinzufügen der Regel

$$(\Gamma\text{-Regel}) \frac{\Pi, \varphi \Rightarrow \Delta}{\Pi \Rightarrow \Delta} \quad \varphi \in \Gamma$$

Theorem (Korrektheit+Vollständigkeit erweiterter SK)

$\Pi \Rightarrow \Delta$ in der Γ -Erweiterung des SK ableitbar gdw. $\Gamma \models \Pi \Rightarrow \Delta$

Kompaktheit

Theorem (Kompaktheitssatz)

Für alle Mengen von Sätzen $\Gamma \subseteq \text{FO}$ und Sätze $\varphi \in \text{FO}$ gilt:

1. Γ ist erfüllbar gdw. jede endliche Teilmenge von Γ erfüllbar ist
2. $\Gamma \models \varphi$ gdw. endliches $\Delta \subseteq \Gamma$ existiert mit $\Delta \models \varphi$

Beweis mittels Γ -Erweiterung des Sequenzenkalküls in der also gilt:

Es gibt SK-Beweis für $\Pi \Rightarrow \Delta$ gdw. $\Gamma \models \bigwedge \Pi \rightarrow \bigvee \Delta$

Beachte: es wird hier eine syntaktische Eigenschaft (Kalkül!)
in eine rein semantische (Erfüllbarkeit, Konsequenz!) übertragen.

Kompaktheit

Wir nutzen die Kompaktheit zum Beweis einiger wichtiger modell-theoretischer Resultate

Diese beziehen sich einerseits auf die Größe von Modellen:

- wie groß können die Modelle einer gegebenen Formel werden?
- gibt es Formeln, die nur in endlichen/unendlichen/abzählbaren/überabzählbaren Modellen erfüllbar sind?

Andererseits erlauben sie uns erste Beobachtungen bezüglich der Grenzen der Ausdruckstärke von FO:

- kann ich eine Eigenschaft wie “das Modell ist endlich/unendlich/abzählbar/überabzählbar” in FO ausdrücken?

Unendliche Modelle

Theorem (unbeschränkte endliche Modelle)

Wenn ein FO-Satz φ beliebig große endliche Modelle besitzt (d.h. für jedes $n \geq 0$ gibt es Modell \mathfrak{A} mit $|A| \geq n$), dann hat φ auch ein unendliches Modell.

Dieses Theorem impliziert eine Beschränkung der Ausdruckstärke von FO:

Es gibt keinen FO-Satz φ so dass $\mathfrak{A} \models \varphi$ gdw. $|A|$ endlich.

“Endlichkeit ist nicht FO-ausdrückbar”

Für ein festes n ist “Modellgröße $\leq n$ ” aber natürlich leicht ausdrückbar:

$$\forall x_0 \cdots \forall x_n \left(\bigvee_{0 \leq i < j \leq n} x_i = x_j \right)$$

Löwenheim-Skolem

Theorem (Aufsteigender Satz von Löwenheim-Skolem)

Wenn ein FO-Satz φ ein unendliches Modell besitzt, dann gibt es für jede Menge U ein Modell \mathfrak{A} von φ mit $|A| \geq |U|$.

Beachte: Die Kardinalität von U ist beliebig!

Es folgt also z.B.:

wenn Γ unendliches Modell hat, dann auch überabzählbares Modell
(also ist auch Abzählbarkeit nicht FO-ausdrückbar)

Korollar (Nicht-Standardmodell der Arithmetik)

$\text{Th}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$ hat Modelle, die nicht isomorph zu $(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$ sind.

Man kann sogar zeigen:

die Arithmetik $(\mathbb{N}, +, *, 0, 1)$ hat abzählbare Nichtstandardmodelle

Löwenheim-Skolem

Das im Vollständigkeitsbeweis des Sequenzenkalküls konstruierte Modell ist endlich oder abzählbar unendlich. Daher gilt:

Theorem (Absteigender Satz von Löwenheim-Skolem)

Wenn ein FO-Satz φ ein Modell besitzt, dann hat φ auch ein endliches oder abzählbar unendliches Modell.

Es gibt also keine FO-Formeln, die nur überabzählbare Modelle haben.

Es folgt: Überabzählbarkeit nicht FO-ausdrückbar

Kapitel 3.3: Ausdrucksstärke / Grundlagen von Ehrenfeucht-Fraïsse Spielen

Eigenschaften / Ausdrückbarkeit

In der Informatik ist die Analyse der Ausdrucksstärke von FO und anderen Logiken ein sehr wichtiges Thema, z.B.:

- Zusammenhang “SQL als FO”:
Kann jede gewünschte Anfrage in SQL/FO ausgedrückt werden?
- FO in der Verifikation von Soft-/Hardware:
Welche Systemeigenschaften können in FO beschrieben werden?
- Später: FO zur Definition von formalen Sprachen
Welche formalen Sprachen können in FO definiert werden?

Ausdrückbarkeit meist leicht zu zeigen, Nicht-Ausdrückbarkeit schwierig!

Eigenschaften / Ausdrückbarkeit

Statt Anfragen / Systemeigenschaften / Sprachen betrachten wir verallgemeinernd *Eigenschaften* von Strukturen

Sei R binäres Relationssymbol, T ternäres Relationssymbol

Beispiel 1: die Eigenschaft “ $R^{\mathfrak{A}}$ ist eine Äquivalenzrelation”
ist FO-ausdrückbar:

$$\varphi = \forall x R(x, x) \wedge \forall x \forall y (R(x, y) \rightarrow R(y, x)) \wedge \\ \forall x \forall y \forall z (R(x, y) \wedge R(y, z) \rightarrow R(x, z))$$

Beispiel 2: ebenso die Eigenschaft

“In $T^{\mathfrak{A}}$ sind die ersten beiden Spalten ein Primärschlüssel”:

$$\varphi = \forall x \forall y \forall z \forall z' ((T(x, y, z) \wedge T(x, y, z')) \rightarrow z = z')$$

Definition Eigenschaft, Ausdruckbarkeit

Eine *Eigenschaft* ist eine Klasse von Strukturen, die unter Isomorphie abgeschlossen ist.

Eine Eigenschaft P ist *FO-ausdrückbar* wenn es einen FO Satz φ gibt so dass $\mathfrak{A} \in P$ gdw. $\mathfrak{A} \models \varphi$ für alle Strukturen \mathfrak{A} .

Beispiele:

$$P_1 = \{\mathfrak{A} \mid R^{\mathfrak{A}} \text{ ist eine Äquivalenzrelation}\}$$

$$P_2 = \{\mathfrak{A} \mid \text{In } T^{\mathfrak{A}} \text{ sind die ersten beiden Spalten ein Primärschlüssel}\}$$

Eigenschaften, die nicht unter Isomorphie abgeschlossen sind,

- sind trivialerweise nicht FO-ausdrückbar
- “passen nicht zur Philosophie von FO”.

Eigenschaften / Ausdrückbarkeit

Die Sätze von Löwenheim/Skolem und verwandte Resultate haben gezeigt, dass folgende Eigenschaften in FO nicht ausdrückbar sind:

- Endlichkeit von Strukturen
- Abzählbarkeit / Überabzählbarkeit von Strukturen

In der Informatik sind aber meist andere Eigenschaften relevant

Im folgenden: Werkzeuge zur Analyse der Ausdrucksstärke

- *Kompaktheitstheorem* ist das klassische Werkzeug aus der mathematischen Logik
- *Ehrenfeucht-Fraïsse Spiele* sind ein sehr flexibles Werkzeug, bieten viele Vorteile

Nicht-Ausdrückbarkeit über Kompaktheit

Zur Erinnerung:

ein ungerichteter Graph $G = (V, E)$ ist *zusammenhängend* wenn es für alle Knoten $v, v' \in V$ eine Knotenfolge v_1, \dots, v_n gibt so dass $v = v_1, v_n = v'$ und $\{v_i, v_{i+1}\} \in E$ für $1 \leq i < n$

Ungerichtete Graphen sind nichts anderes als $\{E\}$ -Strukturen, E binäres Relationssymbol, das symmetrisch interpretiert wird.

In der Mathematik wird Nicht-Ausdrückbarkeit oft über Kompaktheit bewiesen

Theorem

Zusammenhang von ungerichteten Graphen ist nicht FO-ausdrückbar.



Nicht-Ausdrückbarkeit über Kompaktheit

Kann man also Zusammenhang auch in SQL nicht ausdrücken?

Leider können wir das nicht aus dem vorigen Resultat folgern, denn

- Datenbankinstanzen entsprechen *endlichen* Modellen
- Der Kompaktheitssatz gilt auf endlichen Modellen nicht! ●
- Der eben geführte Beweis schließt also nicht aus, dass es einen FO-Satz φ gibt so dass für alle *endlichen* Strukturen \mathfrak{A} gilt:

$$\mathfrak{A} \models \varphi \quad \text{gdw.} \quad \mathcal{A} \text{ zusammenhängend}$$

Wir brauchen ein besseres Werkzeug zur Analyse der Ausdruckstärke!

Ehrenfeucht-Fraïsse Spiele

Ehrenfeucht-Fraïsse Spiele sind eine elegante Beweistechnik, die es erlaubt, die Nicht-Ausdrückbarkeit von Eigenschaften in FO (und anderen Logiken) nachzuweisen.

Eine für die Informatik besonders wichtige Eigenschaft:

Ehrenfeucht-Fraïsse Spiele funktionieren auf endlichen und unendlichen Modellen gleichermaßen

Wie wir gesehen haben, gilt das für viele andere Resultate nicht (z.B. Kompaktheit, rekursive Aufzählbarkeit von Tautologien)

Ehrenfeucht-Fraïsse Spiele

- Zwei Spieler: Spoiler und Duplikator
- Das Spielbrett besteht aus zwei Strukturen \mathfrak{A} und \mathfrak{B} (endlich oder unendlich)
- Die Spieler wechseln sich ab, Spoiler beginnt
- Die zu spielende Rundenzahl k ist beliebig, aber vorher festgelegt
- In jeder Runde wählt Spoiler zunächst eine Struktur (\mathfrak{A} oder \mathfrak{B}), dann ein Element der gewählten Struktur
Duplikator antwortet mit einem Element der anderen Struktur
- Im Prinzip: Spoiler möchte zeigen, dass \mathfrak{A} und \mathfrak{B} unterschiedlich sind, Duplikator dass sie gleich sein
- Die genaue Gewinnbedingung werden wir gleich definieren.



Gewinnbedingung

Der Einfachheit halber arbeiten wir im folgenden mit *relationalen* Signaturen

Wenn \mathfrak{A} Struktur und $S \subseteq A$, so ist $\mathfrak{A}|_S$ die *Einschränkung* von \mathfrak{A} auf S :

- das Universum von $\mathfrak{A}|_S$ ist S
- für alle n -stelligen Relationssymbole R :

$$R^{\mathfrak{A}|_S} = \{(a_1, \dots, a_n) \in R^{\mathfrak{A}} \mid a_1, \dots, a_n \in S\}$$

Definition Partieller Isomorphismus

Seien \mathfrak{A} und \mathfrak{B} τ -Strukturen und $\delta : A \rightarrow B$ eine partielle Funktion mit Definitionsbereich $\text{dom}(\delta)$ und Wertebereich $\text{ran}(\delta)$. Dann ist δ ein *partieller Isomorphismus* wenn δ ein Isomorphismus von $\mathfrak{A}|_{\text{dom}(\delta)}$ nach $\mathfrak{B}|_{\text{ran}(\delta)}$ ist.



Gewinnbedingung

Gewinner eines EF-Spieles:

- Angenommen, es wurden alle k Runden gespielt und in Runde i wurden die Elemente $a_i \in A$ und $b_i \in B$ ausgewählt
- Wenn die erreichte Menge

$$\{(a_1, b_1), \dots, (a_k, b_k)\}$$

ein partieller Isomorphismus ist, gewinnt Duplikator.

- Sonst gewinnt Spoiler.

Uns interessiert weniger der Gewinner eines einzelnen Spielverlaufs, sondern hauptsächlich der Gewinner bei optimaler Spielweise

Gewinnstrategien

- Das Spiel auf \mathcal{A}, \mathcal{B} mit k -Zügen bezeichnen wir mit $\mathcal{G}_k(\mathcal{A}, \mathcal{B})$
- Ein Spieler *hat eine Gewinnstrategie* für $\mathcal{G}_k(\mathcal{A}, \mathcal{B})$
wenn er dieses Spiel gewinnen kann, egal was der andere Spieler tut
- Gewinnstrategien für $\mathcal{G}_k(\mathcal{A}, \mathcal{B})$ kann man anschaulich als
endliche Spielbäume der Tiefe k darstellen
- Für jedes Spiel $\mathcal{G}_k(\mathcal{A}, \mathcal{B})$ hat Spoiler oder Duplikator
eine Gewinnstrategie
(denn das gilt für alle endlichen 2-Personen-Spiele, in denen
kein Unentschieden möglich ist)

Beispiele



Gewinnstrategien

Beachte:

- Abwechselnde Züge entsprechen Quantorenanalternierungen
- Gewinnstrategien für Spoiler und Duplikator sind dual

Gewinnstrategie Spoiler:

\exists Zug Spoiler so dass

\forall Züge Duplikator gilt

\exists Zug Spoiler so dass

\dots

\forall Züge Duplikator gilt

Spiel ist kein part. Isom.

Gewinnstrategie Duplikator:

\forall Züge Spoiler gilt

\exists Zug Duplikator so dass

\forall Züge Spoiler gilt

\dots

\exists Zug Duplikator so dass

Spiel ist part. Isom.

Quantorenrang

Wir stellen nun den Zusammenhang zwischen EF und FO her
Die Anzahl der Spielrunden entspricht dabei dem Quantorenrang

Definition Quantorenrang

Der *Quantorenrang* $qr(\varphi)$ einer Formel φ ist die Schachtelungstiefe von Quantoren in φ . Formal:

- wenn φ ein Atom, dann $qr(\varphi) = 0$
- $qr(\neg\varphi) = qr(\varphi)$
- $qr(\varphi \wedge \psi) = qr(\varphi \vee \psi) = \max\{qr(\varphi), qr(\psi)\}$
- $qr(\exists x \varphi) = qr(\forall x \varphi) = qr(\varphi) + 1$

Beispiel:

$$qr(\exists x (\forall y P(x, y) \vee \exists z \forall y Q(x, y, z))) = 3$$

Ehrenfeucht-Fraïsse Theorem

Theorem (Ehrenfeucht-Fraïsse)

Seien \mathfrak{A} und \mathfrak{B} τ -Strukturen. Für alle $k \geq 0$ sind folgende Aussagen äquivalent:

1. $\mathfrak{A} \models \varphi$ gdw. $\mathfrak{B} \models \varphi$ für alle Sätze $\varphi \in \text{FO}(\tau)$ mit $\text{qr}(\varphi) \leq k$
2. Duplikator hat Gewinnstrategie für $\mathcal{G}_k(\mathfrak{A}, \mathfrak{B})$.

Beachte: \mathfrak{A} und \mathfrak{B} können hier endlich oder unendlich sein.

Beweisidee:

- per Induktion über k
- damit die Induktion durchgeht müssen wir Spiele betrachten, die schon einige Runden gespielt wurden
- in Punkt 1 müssen wir dann auch freie Variablen betrachten

Vollständiger Beweis im Skript von Grädel [StudIP]

Kapitel 3.4: Ehrenfeucht-Fraïsse Spiele: Anwendungen

Methodologie-Theorem

Folgendes Theorem ist die Grundlage für nicht-Ausdrückbarkeitsbeweise mittels EF:

Theorem (Methodologie-Theorem)

Sei P eine Eigenschaft. Wenn es für jedes $k \geq 0$ Strukturen $\mathfrak{A}_k, \mathfrak{B}_k$ gibt, so dass

1. $\mathfrak{A}_k \in P$ und $\mathfrak{B}_k \notin P$
2. Duplikator hat eine Gewinnstrategie für $\mathcal{G}_k(\mathfrak{A}_k, \mathfrak{B}_k)$

dann ist P nicht FO-ausdrückbar.

Funktioniert auch für jede Strukturklasse \mathcal{K} (z.B. alle endlichen Strukturen) solange die Paare $\mathfrak{A}_k, \mathfrak{B}_k$ alle aus \mathcal{K} stammen.

Parität

Wichtige Einschränkung: FO kann nicht “unbeschränkt Zählen”

”Beschränktes Zählen” meint Zählen bis zu Konstante c , z.B.:

$$\forall x_0 \cdots \forall x_c \left(\bigvee_{0 \leq i < j \leq c} x_i = x_j \right) \quad (\text{“Struktur hat Größe } \leq c \text{”})$$

“Unbeschränktes Zählen” z.B.:

- FINITE = $\{\mathfrak{A} \mid |A| \text{ ist endlich (aber beliebig gross)}\}$
- EVEN = $\{\mathfrak{A} \mid |A| \text{ geradzahlig}\}$ und ODD = $\{\mathfrak{A} \mid |A| \text{ ungeradzahlig}\}$

Unendliche Modelle können beliebig zu EVEN/ODD gehören oder nicht.

Theorem

EVEN und ODD sind nicht FO-ausdrückbar, weder in der Klasse aller Strukturen noch in der Klasse der endlichen Strukturen (über einer beliebigen Signatur τ).



Parität

Also kann auch SQL nicht unbeschränkt Zählen, Parität nicht ausdrücken

Das gilt natürlich nicht nur für die Größe des Universums, z.B.

“finde alle Übungsgruppen mit ungradzahlig vielen Studierenden”

auch nicht ausdrückbar (in reinem SQL / relation algebra).

Zusammenhang

Schon gesehen: Zusammenhang von ungerichteten Graphen ist nicht FO-ausdrückbar.

Wir zeigen nun: dies gilt auch in der Klasse aller endlichen Strukturen
(und damit auch für SQL)

Wir wählen ungerichtete Graphen $\mathcal{A}_k, \mathcal{B}_k$ so dass:

- \mathcal{A}_k ein Kreis der Länge 2^k (also zusammenhängend)
- \mathcal{B}_k besteht aus zwei disjunkten Kreisen der Länge 2^k
(also nicht zusammenhängend)

Wir müssen zeigen: Duplikator hat Gewinnstrategie für $\mathcal{G}_k(\mathcal{A}_k, \mathcal{B}_k)$



Zusammenhang

Für zwei Knoten u, v ist die *Distanz* $d(u, v)$

- die Länge des kürzesten Pfades von u nach v wenn so ein Pfad existiert
- $d(u, v) = \infty$ wenn kein solcher Pfad existiert

Für $\ell \geq 0$ ist die ℓ -Nachbarschaft $N_\ell(u) = \{v \in V \mid d(u, v) \leq \ell\}$

Lemma

Duplikator kann $\mathcal{G}_k(\mathcal{A}_k, \mathcal{B}_k)$ so spielen, dass nach i Zügen ein Spielstand $\{(a_1, b_1), \dots, (a_i, b_i)\}$ erreicht ist, so dass für $1 \leq j < \ell \leq i$:

$$(*) \quad d(a_j, a_\ell) = d(b_j, b_\ell) \text{ oder } d(a_j, a_\ell), d(b_j, b_\ell) > 2^{k-i}$$

Korollar

Zusammenhang ist nicht FO-ausdrückbar, weder in der Klasse aller Strukturen noch in der Klasse aller endlichen Strukturen.

Erreichbarkeit

Für viele Anwendungen ist es nützlich, Erreichbarkeit bzgl. einer binären Relation verwenden zu können.

Beispiel SQL:

Datenbank mit Direktverbindungen einer Fluggesellschaft

Mittels Erreichbarkeit bekommt alle Verbindungen, mit und ohne Umsteigen

Wichtiges Resultat:

Theorem

Sei $\tau = \{E\}$ mit E binäre Relation. Es gibt keine Formel $\varphi(x, y) \in \text{FO}(\tau)$ die Erreichbarkeit (entlang E) definiert, d.h. so dass für alle Strukturen $\mathfrak{A} = (A, E^{\mathfrak{A}})$ gilt:

$\mathfrak{A} \models \varphi[a, b]$ gdw. es einen Pfad in \mathfrak{A} von a nach b gibt

Auch nicht FO-ausdrückbar z.B.:

- Azyklizität
- Graphen, die ein Baum sind
- Planarität
- k -Färbbarkeit für beliebiges (fixes) $k \geq 2$
- quasi jede algorithmisch interessante Eigenschaft von Graphen
(wir werden in Teil 4 sehen, warum das so ist!)

Methodologie-Theorem

Nachbemerkung:

Man kann auch folgendes stärkere Methodologie-Theorem beweisen:

Theorem (Methodologie-Theorem)

Sei P eine Eigenschaft. Es gibt für jedes $k \geq 0$ Strukturen $\mathcal{A}_k, \mathcal{B}_k$ so dass

- $\mathcal{A}_k \in P$ und $\mathcal{B}_k \notin P$
- Duplikator hat eine Gewinnstrategie für $\mathcal{G}_k(\mathcal{A}_k, \mathcal{B}_k)$

gdw. P nicht FO-ausdrückbar.

Damit ist der EF-Ansatz für Nicht-Ausdrückbarkeit *vollständig*:

Wenn P nicht FO-ausdrückbar, dann kann man das mittels EF-Spielen beweisen.