

Algorithmen auf Graphen

3. Übungsblatt

Gruppe	
--------	--

Sei $B = (V, E)$ ein nichtleerer Baum, d.h. ein ungerichteter Graph, der zusammenhängend und kreisfrei ist und zudem mindestens einen Knoten hat. Sei weiter

- $noL = \#\{v \in V \mid degree(v) = 1\}$ die Zahl der Blätter (wobei ein *Blatt* ein Knoten mit Grad 1 ist),
- $maxdeg = \max\{degree(v) \mid v \in V\}$ der maximale Grad und $max = \max\{1, maxdeg - 1\}$,
- $diam = \max\{length(p) \mid v, v' \in V, p \in SIMPLE(v, v')\}$ der *Durchmesser*, also die Länge eines längsten einfachen Weges und
- $radius$ der *Radius*, d.h. die Zahl, die durch die Eigenschaft $2 \cdot radius \leq diam \leq 2 \cdot radius + 1$ bestimmt ist.

1. Sei $V = \{1, \dots, 7\}$ eine Menge mit 7 Knoten. Gib für jede der folgenden Eigenschaften jeweils einen Baum mit dieser Knotenmenge an:

- (a) $noL = 2$, (b) $maxdeg = 6$, (c) $diam = noL = maxdeg = 4$.

2. Zeige mit vollständiger Induktion über $radius \geq 1$, dass für alle nichtleeren Bäume gilt:

- (a) $noL \leq max^{radius-1} \cdot (max + 1)$ für geraden Durchmesser $diam = 2 \cdot radius$.
(b) $noL \leq 2 \cdot max^{radius}$ für ungeraden Durchmesser $diam = 2 \cdot radius + 1$.

Tipp: Schneide im Induktionsschluss bei einem Baum mit Radius $k + 1$ alle Blätter von Knoten ab, die dadurch zu Blättern werden.

3. Sei $m \geq 2$. Dann lassen sich die vollständig balancierten Bäume B_i für $i \in \mathbb{N}$ folgendermaßen konstruieren:

- (a) B_1 besteht aus $m + 1$ Knoten, von denen einer mit allen anderen durch je eine Kante verbunden ist; dieser Knoten mit Grad m ist die Wurzel von B_1 .
(b) Für $i \geq 1$ besteht B_{i+1} aus B_1 und m Kopien von B_i , wobei jedes Blatt von B_1 mit einer Wurzel je eines B_i verschmolzen wird; die Wurzel von B_1 wird damit auch Wurzel von B_{i+1} .

Es ist nicht schwer zu zeigen (und darf vorausgesetzt werden), dass $noL(B_i) = m^i$, $diam(B_i) = 2 \cdot i$ und $radius(B_i) = i$ für $i \in \mathbb{N}$ gilt.

Konstruiere mit Hilfe der B_i für alle $j \geq 2$ Bäume C_j mit $diam(C_j) = j$, so dass die Ungleichungen in 2 zu Gleichungen werden (mit Beweis).