

Korrekte Software: Grundlagen und Methoden
Vorlesung 3 vom 27.04.21
Denotationale Semantik

Serge Autexier, Christoph Lüth

Universität Bremen

Sommersemester 2021

Organisatorisches

- ▶ Übungsblätter: 17 Repositories.
- ▶ Organisation der Repos:
 - ▶ Flach (keine Unterverzeichnisse Abgaben, ueb01 o.ä.)
 - ▶ Lösung in uebung-XX.pdf oder uebung-XX.md.
 - ▶ Abgabe auch in Markdown möglich (git-freundlicher).
 - ▶ Bewertungen in 00-BEWERTUNG.md (fortgeschrieben).
- ▶ Feedback.

Fahrplan

- ▶ Einführung
- ▶ Operationale Semantik
- ▶ Denotationale Semantik
- ▶ Äquivalenz der Operationalen und Denotationalen Semantik
- ▶ Der Floyd-Hoare-Kalkül I
- ▶ Der Floyd-Hoare-Kalkül II: Invarianten
- ▶ Korrektheit des Floyd-Hoare-Kalküls
- ▶ Strukturierte Datentypen
- ▶ Verifikationsbedingungen
- ▶ Vorwärts mit Floyd und Hoare
- ▶ Modellierung
- ▶ Spezifikation von Funktionen
- ▶ Referenzen und Speichermodelle
- ▶ Ausblick und Rückblick

Überblick

- ▶ Denotationale Semantik für C0
- ▶ Fixpunkte

Denotationale Semantik — Motivation

▶ Operationale Semantik:

Eine Menge von Regeln, die einen Zustand und ein Programm in einen neuen Zustand oder Fehler überführen

$$\langle c, \sigma \rangle \rightarrow_{Stmnt} \sigma' \mid \perp$$

▶ Denotationale Semantik:

Eine Menge von Regeln, die ein Programm in eine **partielle Funktion** von Zustand nach Zustand überführen

Denotat

$$\llbracket c \rrbracket_c : \Sigma \rightarrow \Sigma$$

Denotationale Semantik — Motivation

Zwei Programme sind äquivalent gdw. sie immer zum selben Zustand (oder Fehler) auswerten

$$c_0 \sim c_1 \text{ iff } (\forall \sigma, \sigma'. \langle c_0, \sigma \rangle \rightarrow_{Stmt} \sigma' \Leftrightarrow \langle c_1, \sigma \rangle \rightarrow_{Stmt} \sigma')$$

oder

Zwei Programme sind äquivalent gdw. sie dieselbe partielle Funktion **denotieren**

$$c_0 \sim c_1 \text{ iff } \{(\sigma, \sigma') \mid \langle c_0, \sigma \rangle \rightarrow_{Stmt} \sigma'\} = \{(\sigma, \sigma') \mid \langle c_1, \sigma \rangle \rightarrow_{Stmt} \sigma'\}$$

Kompositionalität

- ▶ Semantik von zusammengesetzten Ausdrücken durch Kombination der Semantiken der Teilausdrücke
 - ▶ Bsp: Semantik einer Sequenz von Anweisungen durch Verknüpfung der Semantik der einzelnen Anweisungen
- ▶ Operationale Semantik ist **nicht** kompositional:

```
x= 3;  
y= x+ 7; // (*)  
z= x+ y;
```

- ▶ Semantik von Zeile (*) ergibt sich aus der Ableitung davor
- ▶ Kann nicht unabhängig abgeleitet werden

- ▶ Denotationale Semantik ist kompositional.
 - ▶ Wesentlicher Baustein: **partielle Funktionen**

Partielle Funktion

Definition (Partielle Funktion)

Eine **partielle Funktion** $f : X \rightarrow Y$ ist eine Relation $f \subseteq X \times Y$ so dass wenn $(x, y_1) \in f$ und $(x, y_2) \in f$ dann $y_1 = y_2$ (**Rechtseindeutigkeit**)

- ▶ Notation: für $f : X \rightarrow Y$, $(x, y) \in f \iff f(x) = y$.
- ▶ Wir benutzen beide Notationen, aber für die denotationale Semantik die Paar-Notation.
- ▶ Zustände sind partielle Abbildungen (\longrightarrow letzte Vorlesung)
- ▶ Insbesondere **Systemzustände** $\Sigma \stackrel{\text{def}}{=} \mathbf{Loc} \rightarrow \mathbf{V}$

Beispiel

Als Beispiel betrachten wir die partielle Funktion $div3 : \{0 \dots 10\} \rightarrow \mathbb{N}$

$$div3(x) = y \quad \text{g.d.w.} \quad 3 \cdot y = x$$

► Zuordnung:

$$0 \mapsto 0$$

1

2

$$3 \mapsto 1$$

4

5

$$6 \mapsto 2$$

7

8

$$9 \mapsto 3$$

10

► Notation als Relation (**Graph**):

$$div3 \stackrel{def}{=} \{(0, 0), (3, 1), (6, 2), (9, 3)\}$$

► Wir schreiben

$$div3(3) = 1 \quad \text{für } (3, 1) \in div3$$

$$div3(5) = \perp \quad \text{für es gibt kein } y \text{ mit } (5, y) \in div3$$

$$div3(5) = \perp \quad \text{für } \forall y. (5, y) \notin div3$$

► Achtung, Partialität!

Arbeitsblatt 3.1: Relationen als Funktionen

Definiert wie im Beispiel eben die Funktion $\text{sqrt} : \{0, \dots, 100\} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

$$\text{sqrt}(x) = y \quad \text{g.d.w.} \quad y^2 = x$$

Was ist der Wert folgender Ausdrücke:

$$t_1 = 5 - \text{sqrt}(32) \quad t_2 = \text{sqrt}(49) + \text{sqrt}(0) \quad t_3 = \sqrt{3} \cdot \text{sqrt}(3) \quad t_4 = \frac{\text{sqrt}(64)}{0}$$

Arbeitsblatt 3.1: Relationen als Funktionen

Definiert wie im Beispiel eben die Funktion $\text{sqrt} : \{0, \dots, 100\} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

$$\text{sqrt}(x) = y \quad \text{g.d.w.} \quad y^2 = x$$

Was ist der Wert folgender Ausdrücke:

$$t_1 = 5 - \text{sqrt}(32) \quad t_2 = \text{sqrt}(49) + \text{sqrt}(0) \quad t_3 = \sqrt{3} \cdot \text{sqrt}(3) \quad t_4 = \frac{\text{sqrt}(64)}{0}$$

Denotierende Funktionen (Denotate)

- ▶ Arithmetische Ausdrücke: $a \in \mathbf{Aexp}$ denotiert eine partielle Funktion $\Sigma \rightarrow \mathbb{Z}$
- ▶ Boolesche Ausdrücke: $b \in \mathbf{Bexp}$ denotiert eine partielle Funktion $\Sigma \rightarrow \mathbb{B}$
- ▶ Anweisungen: $c \in \mathbf{Stmt}$ denotiert eine partielle Funktion $\Sigma \rightarrow \Sigma$

Denotat von Aexp

$$\llbracket a \rrbracket_{\mathcal{A}} : \mathbf{Aexp} \rightarrow (\Sigma \rightarrow \mathbb{Z})$$

$$\llbracket n \rrbracket_{\mathcal{A}} = \{(\sigma, \llbracket n \rrbracket) \mid \sigma \in \Sigma\}$$

$$\llbracket x \rrbracket_{\mathcal{A}} = \{(\sigma, \sigma(x)) \mid \sigma \in \Sigma, x \in \text{Dom}(\sigma)\}$$

$$\llbracket a_0 + a_1 \rrbracket_{\mathcal{A}} = \{(\sigma, n_0 + n_1) \mid (\sigma, n_0) \in \llbracket a_0 \rrbracket_{\mathcal{A}} \wedge (\sigma, n_1) \in \llbracket a_1 \rrbracket_{\mathcal{A}}\}$$

$$\llbracket a_0 - a_1 \rrbracket_{\mathcal{A}} = \{(\sigma, n_0 - n_1) \mid (\sigma, n_0) \in \llbracket a_0 \rrbracket_{\mathcal{A}} \wedge (\sigma, n_1) \in \llbracket a_1 \rrbracket_{\mathcal{A}}\}$$

$$\llbracket a_0 * a_1 \rrbracket_{\mathcal{A}} = \{(\sigma, n_0 * n_1) \mid (\sigma, n_0) \in \llbracket a_0 \rrbracket_{\mathcal{A}} \wedge (\sigma, n_1) \in \llbracket a_1 \rrbracket_{\mathcal{A}}\}$$

$$\llbracket a_0 / a_1 \rrbracket_{\mathcal{A}} = \{(\sigma, n_0 \div n_1) \mid (\sigma, n_0) \in \llbracket a_0 \rrbracket_{\mathcal{A}} \wedge (\sigma, n_1) \in \llbracket a_1 \rrbracket_{\mathcal{A}} \wedge n_1 \neq 0\}$$

Rechtseindeutigkeit

Lemma (Partielle Funktion)

$\llbracket - \rrbracket_{\mathcal{A}}$ ist rechtseindeutig und damit eine *partielle Funktion*.

Beweis.

z.z.: wenn $(\sigma, v_1) \in \llbracket a \rrbracket_{\mathcal{A}}, (\sigma, v_2) \in \llbracket a \rrbracket_{\mathcal{A}}$ dann $v_1 = v_2$.

Strukturelle Induktion über **Aexp**:

Rechtseindeutigkeit

Lemma (Partielle Funktion)

$\llbracket - \rrbracket_{\mathcal{A}}$ ist rechtseindeutig und damit eine *partielle Funktion*.

Beweis.

z.z.: wenn $(\sigma, v_1) \in \llbracket a \rrbracket_{\mathcal{A}}, (\sigma, v_2) \in \llbracket a \rrbracket_{\mathcal{A}}$ dann $v_1 = v_2$.

Strukturelle Induktion über **Aexp**:

► Induktionsbasis sind $n \in \mathbf{Z}$ und $x \in \mathbf{Idt}$.

Sei $a \equiv x$, dann $v_1 = \sigma(x) = v_2$.

Rechtseindeutigkeit

Lemma (Partielle Funktion)

$\llbracket - \rrbracket_{\mathcal{A}}$ ist rechtseindeutig und damit eine **partielle Funktion**.

Beweis.

z.z.: wenn $(\sigma, v_1) \in \llbracket a \rrbracket_{\mathcal{A}}, (\sigma, v_2) \in \llbracket a \rrbracket_{\mathcal{A}}$ dann $v_1 = v_2$.

Strukturelle Induktion über **Aexp**:

- ▶ Induktionsbasis sind $n \in \mathbf{Z}$ und $x \in \mathbf{Idt}$.

Sei $a \equiv x$, dann $v_1 = \sigma(x) = v_2$.

- ▶ Induktionsschritt sind die anderen Klauseln.

Sei $a \equiv a_1 + a_2$.

Induktionsannahme ist: wenn $(\sigma, n_i) \in \llbracket a_i \rrbracket_{\mathcal{A}}, (\sigma, m_i) \in \llbracket a_i \rrbracket_{\mathcal{A}}$ dann $n_i = m_i$.

Sei $v_1 = (\sigma, n_1 + n_2)$ mit $(\sigma, n_1) \in \llbracket a_1 \rrbracket_{\mathcal{A}}, (\sigma, n_2) \in \llbracket a_2 \rrbracket_{\mathcal{A}}$, und $v_2 = m_1 + m_2$ mit $(\sigma, m_1) \in \llbracket a_1 \rrbracket_{\mathcal{A}}, (\sigma, m_2) \in \llbracket a_2 \rrbracket_{\mathcal{A}}$.

Rechtseindeutigkeit

Lemma (Partielle Funktion)

$\llbracket - \rrbracket_{\mathcal{A}}$ ist rechtseindeutig und damit eine **partielle Funktion**.

Beweis.

z.z.: wenn $(\sigma, v_1) \in \llbracket a \rrbracket_{\mathcal{A}}, (\sigma, v_2) \in \llbracket a \rrbracket_{\mathcal{A}}$ dann $v_1 = v_2$.

Strukturelle Induktion über **Aexp**:

- ▶ Induktionsbasis sind $n \in \mathbf{Z}$ und $x \in \mathbf{Idt}$.

Sei $a \equiv x$, dann $v_1 = \sigma(x) = v_2$.

- ▶ Induktionsschritt sind die anderen Klauseln.

Sei $a \equiv a_1 + a_2$.

Induktionsannahme ist: wenn $(\sigma, n_i) \in \llbracket a_i \rrbracket_{\mathcal{A}}, (\sigma, m_i) \in \llbracket a_i \rrbracket_{\mathcal{A}}$ dann $n_i = m_i$.

Sei $v_1 = (\sigma, n_1 + n_2)$ mit $(\sigma, n_1) \in \llbracket a_1 \rrbracket_{\mathcal{A}}, (\sigma, n_2) \in \llbracket a_2 \rrbracket_{\mathcal{A}}$, und $v_2 = m_1 + m_2$ mit $(\sigma, m_1) \in \llbracket a_1 \rrbracket_{\mathcal{A}}, (\sigma, m_2) \in \llbracket a_2 \rrbracket_{\mathcal{A}}$.

Aus der Annahme folgt $n_1 = m_1$ und $n_2 = m_2$, deshalb $v_1 = v_2$.



Kompositionalität und Striktheit

- ▶ Die Rechtseindeutigkeit erlaubt die Notation als partielle Funktion:

$$\begin{aligned}\llbracket 3 * (x + y) \rrbracket_{\mathcal{A}}(\sigma) &= \llbracket 3 \rrbracket_{\mathcal{A}}(\sigma) \cdot (\llbracket x \rrbracket_{\mathcal{A}}(\sigma) + \llbracket y \rrbracket_{\mathcal{A}}(\sigma)) \\ &= 3 \cdot (\llbracket x \rrbracket_{\mathcal{A}}(\sigma) + \llbracket y \rrbracket_{\mathcal{A}}(\sigma)) \\ &= 3 \cdot (\sigma(x) + \sigma(y))\end{aligned}$$

- ▶ Diese Notation versteckt die **Partialität**:

$$\llbracket 1 + x/0 \rrbracket_{\mathcal{A}}(\sigma) = 1 + \sigma(x)/0 = 1 + \perp = \perp$$

- ▶ Wenn ein Teilausdruck undefiniert ist, wird der gesamte Ausdruck undefiniert: $\llbracket - \rrbracket_{\mathcal{A}}$ ist **strikt** für alle arithmetischen Operatoren.

Arbeitsblatt 3.2: Semantik I

Hier üben wir noch einmal den Zusammenhang zwischen den beiden Notationen. Gegeben sei der Zustand $s = \langle x \mapsto 3, y \mapsto 4 \rangle$ und der Ausdruck $a = 7 * x + y$.

Berechnen Sie die Semantik zum einen als Relation (füllen Sie die Fragezeichen aus):

$$(s, ?) : [[7]]$$

$$(s, ?) : [[x]]$$

$$(s, ?) : [[7*x]]$$

$$(s, ?) : [[y]]$$

$$(s, ?) : [[7*x + y]]$$

Berechnen Sie zum anderen die Semantik in der Funktionsnotation:

$$[[7*x+y]](s) = [[7*x]](s) + [[y]](s) = \dots = ?$$

Ist das Ergebnis am Ende gleich?

Lösung

Denotat von Bexp

$$\llbracket a \rrbracket_{\mathcal{B}} : \mathbf{Bexp} \rightarrow (\Sigma \rightarrow \mathbb{B})$$

$$\llbracket \mathbf{1} \rrbracket_{\mathcal{B}} = \{(\sigma, true) \mid \sigma \in \Sigma\}$$

$$\llbracket \mathbf{0} \rrbracket_{\mathcal{B}} = \{(\sigma, false) \mid \sigma \in \Sigma\}$$

$$\begin{aligned} \llbracket a_0 == a_1 \rrbracket_{\mathcal{B}} = & \{(\sigma, true) \mid \sigma \in \Sigma, (\sigma, n_0) \in \llbracket a_0 \rrbracket_{\mathcal{A}}, (\sigma, n_1) \in \llbracket a_1 \rrbracket_{\mathcal{A}}, n_0 = n_1\} \\ & \cup \{(\sigma, false) \mid \sigma \in \Sigma, (\sigma, n_0) \in \llbracket a_0 \rrbracket_{\mathcal{A}}, (\sigma, n_1) \in \llbracket a_1 \rrbracket_{\mathcal{A}}, n_0 \neq n_1\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \llbracket a_0 < a_1 \rrbracket_{\mathcal{B}} = & \{(\sigma, true) \mid \sigma \in \Sigma, (\sigma, n_0) \in \llbracket a_0 \rrbracket_{\mathcal{A}}, (\sigma, n_1) \in \llbracket a_1 \rrbracket_{\mathcal{A}}, n_0 < n_1\} \\ & \cup \{(\sigma, false) \mid \sigma \in \Sigma, (\sigma, n_0) \in \llbracket a_0 \rrbracket_{\mathcal{A}}, (\sigma, n_1) \in \llbracket a_1 \rrbracket_{\mathcal{A}}, n_0 \geq n_1\} \end{aligned}$$

Denotat von Bexp

$$\llbracket a \rrbracket_{\mathcal{B}} : \mathbf{Bexp} \rightarrow (\Sigma \rightarrow \mathbb{B})$$

$$\begin{aligned} \llbracket !b \rrbracket_{\mathcal{B}} &= \{(\sigma, true) \mid \sigma \in \Sigma, (\sigma, false) \in \llbracket b \rrbracket_{\mathcal{B}}\} \\ &\cup \{(\sigma, false) \mid \sigma \in \Sigma, (\sigma, true) \in \llbracket b \rrbracket_{\mathcal{B}}\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \llbracket b_1 \ \&\& \ b_2 \rrbracket_{\mathcal{B}} &= \{(\sigma, false) \mid \sigma \in \Sigma, (\sigma, false) \in \llbracket b_1 \rrbracket_{\mathcal{B}}\} \\ &\cup \{(\sigma, t_2) \mid \sigma \in \Sigma, (\sigma, true) \in \llbracket b_1 \rrbracket_{\mathcal{B}}, (\sigma, t_2) \in \llbracket b_2 \rrbracket_{\mathcal{B}}\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \llbracket b_1 \ \parallel \ b_2 \rrbracket_{\mathcal{B}} &= \{(\sigma, true) \mid \sigma \in \Sigma, (\sigma, true) \in \llbracket b_1 \rrbracket_{\mathcal{B}}\} \\ &\cup \{(\sigma, t_2) \mid \sigma \in \Sigma, (\sigma, false) \in \llbracket b_1 \rrbracket_{\mathcal{B}}, (\sigma, t_2) \in \llbracket b_2 \rrbracket_{\mathcal{B}}\} \end{aligned}$$

Kompositionalität und Striktheit

Lemma (Partielle Funktion)

$\llbracket - \rrbracket_B$ ist rechtseindeutig und damit eine **partielle Funktion**.

- ▶ Beweis analog zu $\llbracket - \rrbracket_A$.
- ▶ Ist $\llbracket - \rrbracket_B$ strikt?

Kompositionalität und Striktheit

Lemma (Partielle Funktion)

$\llbracket - \rrbracket_{\mathcal{B}}$ ist rechtseindeutig und damit eine **partielle Funktion**.

- ▶ Beweis analog zu $\llbracket - \rrbracket_{\mathcal{A}}$.
- ▶ Ist $\llbracket - \rrbracket_{\mathcal{B}}$ strikt? Natürlich nicht:
- ▶ Sei $\llbracket b_1 \rrbracket_{\mathcal{B}}(\sigma) = false$, dann $\llbracket b_1 \ \&\& \ b_2 \rrbracket_{\mathcal{B}}(\sigma) = \llbracket b_1 \rrbracket_{\mathcal{B}}(\sigma) = false$

Kompositionalität und Striktheit

Lemma (Partielle Funktion)

$\llbracket - \rrbracket_{\mathcal{B}}$ ist rechtseindeutig und damit eine **partielle Funktion**.

- ▶ Beweis analog zu $\llbracket - \rrbracket_{\mathcal{A}}$.
- ▶ Ist $\llbracket - \rrbracket_{\mathcal{B}}$ strikt? Natürlich nicht:
- ▶ Sei $\llbracket b_1 \rrbracket_{\mathcal{B}}(\sigma) = false$, dann $\llbracket b_1 \ \&\& \ b_2 \rrbracket_{\mathcal{B}}(\sigma) = \llbracket b_1 \rrbracket_{\mathcal{B}}(\sigma) = false$
- ▶ Wir können deshalb nicht so einfach schreiben $\llbracket b_1 \ \&\& \ b_2 \rrbracket_{\mathcal{B}}(\sigma) = \llbracket b_1 \rrbracket_{\mathcal{B}}(\sigma) \wedge \llbracket b_2 \rrbracket_{\mathcal{B}}(\sigma)$
- ▶ Die normale zweiwertige Logik behandelt Definiiertheit gar nicht. Bei uns müssen die logischen Operatoren links-strikt sein:

$$\perp \wedge a = \perp$$

$$false \wedge a = false$$

$$true \wedge a = a$$

$$\perp \vee a = \perp$$

$$true \vee a = true$$

$$false \vee a = a$$

Arbeitsblatt 3.3: Semantik II

Wir üben noch einmal die Nichtstriktheit. Gegeben $s = \langle x \mapsto 7 \rangle$ und $b \equiv (7 == x) \parallel (x/0 == 1)$

Berechnen Sie die Semantik in den Notationen von oben:

$(s, ?) : [[(7 == x) \parallel (x/0 == 1)]]$

...

$[[(7 == x) \parallel (x/0 == 1)]](s) = \dots ?$

Hilfreiche Notation: $a \wedge b = a \ / \ \& \ b$, $a \vee b = a \ \backslash / \ b$

Lösung

`(s, 7) : [[7]]`

`(s, 3) : [[x]]`

`(s, True) : [[7 == x]]`

`(s, True) : [[(7 == x) || (x/0 == 1)]]`

Alternativ:

`[[(7 == x) || (x/0 == 1)]](s) =`

`[[(7 == x)]](s) \/
[[(x/0 == 1)]](s) =`

`([[7]](s) = [[x]](s) \/
[[x/0]](s) = [[1]](s)) =`

`(7 = 7 \/
\bot = 1) =`

`(True \/
\bot) =`

True

Denotationale Semantik von Anweisungen

- ▶ Zuweisung: punktweise Änderung des Zustands σ zu $\sigma[x \mapsto n]$
- ▶ Sequenz: Komposition von Relationen

Definition (Komposition von Relationen)

Für zwei Relationen $R \subseteq X \times Y, S \subseteq Y \times Z$ ist ihre **Komposition**

$$R \circ S \stackrel{\text{def}}{=} \{(x, z) \mid \exists y \in Y. (x, y) \in R \wedge (y, z) \in S\}$$

Wenn R, S zwei partielle Funktionen sind, ist $R \circ S$ ihre Funktionskomposition.

- ▶ Leere Sequenz: Leere Funktion?

Denotationale Semantik von Anweisungen

- ▶ Zuweisung: punktweise Änderung des Zustands σ zu $\sigma[x \mapsto n]$
- ▶ Sequenz: Komposition von Relationen

Definition (Komposition von Relationen)

Für zwei Relationen $R \subseteq X \times Y, S \subseteq Y \times Z$ ist ihre **Komposition**

$$R \circ S \stackrel{\text{def}}{=} \{(x, z) \mid \exists y \in Y. (x, y) \in R \wedge (y, z) \in S\}$$

Wenn R, S zwei partielle Funktionen sind, ist $R \circ S$ ihre Funktionskomposition.

- ▶ Leere Sequenz: Leere Funktion? Nein, Identität. Für Menge X ,

$$\text{Id}_X \stackrel{\text{def}}{=} X \times X = \{(x, x) \mid x \in X\}$$

ist die **Identitätsfunktion** ($\text{Id}_X(x) = x$).

Arbeitsblatt 3.4: Komposition von Relationen

Zur Übung: betrachten Sie folgende Relationen:

$$R = \{(1, 7), (2, 3), (3, 9), (4, 3)\}$$

$$cS = \{(1, 0), (2, 0), (3, 1), (4, 7), (5, 9), (7, 3), (8, 15)\}$$

Berechnen Sie $R \circ S = \{(1, ?), \dots\}$

Arbeitsblatt 3.4: Komposition von Relationen

Zur Übung: betrachten Sie folgende Relationen:

$$R = \{(1, 7), (2, 3), (3, 9), (4, 3)\}$$

$$cS = \{(1, 0), (2, 0), (3, 1), (4, 7), (5, 9), (7, 3), (8, 15)\}$$

Berechnen Sie $R \circ S = \{(1, ?), \dots\}$

Arbeitsblatt 3.4: Komposition von Relationen

Zur Übung: betrachten Sie folgende Relationen:

$$R = \{(1, 7), (2, 3), (3, 9), (4, 3)\}$$

$$cS = \{(1, 0), (2, 0), (3, 1), (3, 5), (4, 7), (5, 9), (7, 3), (8, 15)\}$$

Berechnen Sie $R \circ S = \{(1, ?), \dots\}$

Denotat von Stmt

$$\llbracket \cdot \rrbracket_c : \mathbf{Stmt} \rightarrow (\Sigma \rightarrow \Sigma)$$

$$\llbracket x = a \rrbracket_c = \{(\sigma, \sigma[x \mapsto n]) \mid \sigma \in \Sigma \wedge (\sigma, n) \in \llbracket a \rrbracket_{\mathcal{A}}\}$$

$$\llbracket c_1; c_2 \rrbracket_c = \llbracket c_1 \rrbracket_c \circ \llbracket c_2 \rrbracket_c$$

$$\llbracket \{ \} \rrbracket_c = \mathbf{Id}_{\Sigma}$$

$$\begin{aligned} \llbracket \mathbf{if} (b) c_0 \mathbf{else} c_1 \rrbracket_c = & \{(\sigma, \sigma') \mid (\sigma, \mathit{true}) \in \llbracket b \rrbracket_{\mathcal{B}} \wedge (\sigma, \sigma') \in \llbracket c_0 \rrbracket_c\} \\ & \cup \{(\sigma, \sigma') \mid (\sigma, \mathit{false}) \in \llbracket b \rrbracket_{\mathcal{B}} \wedge (\sigma, \sigma') \in \llbracket c_1 \rrbracket_c\} \end{aligned}$$

Denotat von Stmt

$$\llbracket \cdot \rrbracket_c : \mathbf{Stmt} \rightarrow (\Sigma \rightarrow \Sigma)$$

$$\llbracket x = a \rrbracket_c = \{(\sigma, \sigma[x \mapsto n]) \mid \sigma \in \Sigma \wedge (\sigma, n) \in \llbracket a \rrbracket_{\mathcal{A}}\}$$

$$\llbracket c_1; c_2 \rrbracket_c = \llbracket c_1 \rrbracket_c \circ \llbracket c_2 \rrbracket_c$$

$$\llbracket \{ \} \rrbracket_c = \mathbf{Id}_{\Sigma}$$

$$\begin{aligned} \llbracket \mathbf{if} (b) c_0 \mathbf{else} c_1 \rrbracket_c = & \{(\sigma, \sigma') \mid (\sigma, \mathit{true}) \in \llbracket b \rrbracket_{\mathcal{B}} \wedge (\sigma, \sigma') \in \llbracket c_0 \rrbracket_c\} \\ & \cup \{(\sigma, \sigma') \mid (\sigma, \mathit{false}) \in \llbracket b \rrbracket_{\mathcal{B}} \wedge (\sigma, \sigma') \in \llbracket c_1 \rrbracket_c\} \end{aligned}$$

Aber was ist

$$\llbracket \mathbf{while} (b) c \rrbracket_c = ??$$

Denotationale Semantik von while

- ▶ Sei $w \equiv \mathbf{while} (b) c$ (und $\sigma \in \Sigma$). Operational gilt:

$$w \sim \mathbf{if} (b) \{c; w\} \mathbf{else} \{ \}$$

- ▶ Dann sollte auch gelten

$$\llbracket w \rrbracket_c \stackrel{?}{=} \llbracket \mathbf{if} (b) \{c; w\} \mathbf{else} \{ \} \rrbracket_c$$

- ▶ Das ist eine **rekursive** Definition von $\llbracket w \rrbracket_c$:

$$x = F(x)$$

- ▶ Das ist ein **Fixpunkt**:

$$x = \mathit{fix}(F)$$

- ▶ Was ist das?

Fixpunkte

Definition (Fixpunkt)

Für $f : X \rightarrow X$ ist ein **Fixpunkt** ein $x \in X$ so dass $f(x) = x$.

- ▶ Hat jede Funktion $f : X \rightarrow X$ einen Fixpunkt?

Fixpunkte

Definition (Fixpunkt)

Für $f : X \rightarrow X$ ist ein **Fixpunkt** ein $x \in X$ so dass $f(x) = x$.

- ▶ Hat jede Funktion $f : X \rightarrow X$ einen Fixpunkt? Nein
- ▶ Kann eine Funktion mehrere Fixpunkte haben?

Fixpunkte

Definition (Fixpunkt)

Für $f : X \rightarrow X$ ist ein **Fixpunkt** ein $x \in X$ so dass $f(x) = x$.

- ▶ Hat jede Funktion $f : X \rightarrow X$ einen Fixpunkt? Nein
- ▶ Kann eine Funktion mehrere Fixpunkte haben? Ja — aber nur einen kleinsten.
- ▶ Beispiele
 - ▶ Fixpunkte von $f(x) = \sqrt{x}$ sind 0 und 1; ebenfalls für $f(x) = x^2$.
 - ▶ Für die Sortierfunktion sind alle sortierten Listen Fixpunkte
 - ▶ Die Funktion $f(x) = x + 1$ hat keinen Fixpunkt in \mathbb{Z}
 - ▶ Die Funktion $f(X) = \mathbb{P}(X)$ hat überhaupt keinen Fixpunkt
- ▶ $\text{fix}(f)$ ist also der **kleinste Fixpunkt** von f .

Konstruktion des kleinsten Fixpunktes (Kurzversion)

- ▶ Gegeben Funktion Γ auf Denotaten $\Gamma : (\Sigma \rightarrow \Sigma) \rightarrow (\Sigma \rightarrow \Sigma)$
- ▶ Wir konstruieren eine Sequenz $\Gamma^i : \Sigma \rightarrow \Sigma$ (mit $i \in \mathbb{N}$) von Funktionen:

$$\Gamma^0(s) \stackrel{\text{def}}{=} \emptyset$$

$$\Gamma^{i+1}(s) \stackrel{\text{def}}{=} \Gamma(\Gamma^i)(s)$$

- ▶ Dann ist

$$\text{fix}(\Gamma) \stackrel{\text{def}}{=} \bigcup_{i \in \mathbb{N}} \Gamma^i$$

- ▶ Verkürzte Version — der Fixpunkt muss so nicht existieren (er tut es aber für alle Programme)

Denotationale Semantik für die Iteration

▶ Sei $w \equiv \mathbf{while} (b) c$

▶ Konstruktion: “Auffalten” der Schleife (f ist ein Denotat):

$$\Gamma(f) = \{(\sigma, \sigma') \mid (\sigma, true) \in \llbracket b \rrbracket_{\mathcal{B}} \wedge (\sigma, \sigma') \in \llbracket c \rrbracket_c \circ f\} \\ \cup \{(\sigma, \sigma) \mid (\sigma, false) \in \llbracket b \rrbracket_{\mathcal{B}}\}$$

▶ b und c sind Parameter von Γ

▶ Dann ist

$$\llbracket w \rrbracket_c = \mathit{fix}(\Gamma)$$

Denotation für Stmt

$$\llbracket \cdot \rrbracket_C : \{ Stmt \rightarrow (\Sigma \rightarrow \Sigma) \}$$

$$\llbracket x = a \rrbracket_C = \{ (\sigma, \sigma[x \mapsto n]) \mid \sigma \in \Sigma \wedge (\sigma, n) \in \llbracket a \rrbracket_A \}$$

$$\llbracket c_1; c_2 \rrbracket_C = \llbracket c_1 \rrbracket_C \circ \llbracket c_2 \rrbracket_C$$

$$\llbracket \{ \} \rrbracket_C = \text{Id}_\Sigma$$

$$\llbracket \text{if } (b) \ c_0 \ \text{else} \ c_1 \rrbracket_C = \{ (\sigma, \sigma') \mid (\sigma, \text{true}) \in \llbracket b \rrbracket_B \wedge (\sigma, \sigma') \in \llbracket c_0 \rrbracket_C \} \\ \cup \{ (\sigma, \sigma') \mid (\sigma, \text{false}) \in \llbracket b \rrbracket_B \wedge (\sigma, \sigma') \in \llbracket c_1 \rrbracket_C \}$$

$$\llbracket \text{while } (b) \ c \rrbracket_C = \text{fix}(\Gamma)$$

$$\Gamma(s) = \{ (\sigma, \sigma') \mid (\sigma, \text{true}) \in \llbracket b \rrbracket_B \wedge (\sigma, \sigma') \in \llbracket c \rrbracket_C \circ s \} \\ \cup \{ (\sigma, \sigma) \mid (\sigma, \text{false}) \in \llbracket b \rrbracket_B \}$$

Der Fixpunkt bei der Arbeit (I)

```
while (x < 0) {  
  x = x + 1;  
}
```

$$\Gamma(f)(\sigma) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} \sigma & \sigma(x) \geq 0 \\ f(\sigma[x \mapsto \sigma(x) + 1]) & \sigma(x) < 0 \end{cases}$$

Wir betrachten den Zustand $s = \langle x \mapsto ? \rangle$ (nur eine Variable):

Der Fixpunkt bei der Arbeit (I)

```
while (x < 0) {  
  x = x + 1;  
}
```

$$\Gamma(f)(\sigma) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} \sigma & \sigma(x) \geq 0 \\ f(\sigma[x \mapsto \sigma(x) + 1]) & \sigma(x) < 0 \end{cases}$$

Wir betrachten den Zustand $s = \langle x \mapsto ? \rangle$ (nur eine Variable):

s
-2
-1
0
1

Der Fixpunkt bei der Arbeit (I)

```
while (x < 0) {  
  x = x + 1;  
}
```

$$\Gamma(f)(\sigma) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} \sigma & \sigma(x) \geq 0 \\ f(\sigma[x \mapsto \sigma(x) + 1]) & \sigma(x) < 0 \end{cases}$$

Wir betrachten den Zustand $s = \langle x \mapsto ? \rangle$ (nur eine Variable):

s	$\Gamma^0(s)$
-2	\perp
-1	\perp
0	\perp
1	\perp

Der Fixpunkt bei der Arbeit (I)

```
while (x < 0) {  
  x = x + 1;  
}
```

$$\Gamma(f)(\sigma) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} \sigma & \sigma(x) \geq 0 \\ f(\sigma[x \mapsto \sigma(x) + 1]) & \sigma(x) < 0 \end{cases}$$

Wir betrachten den Zustand $s = \langle x \mapsto ? \rangle$ (nur eine Variable):

s	$\Gamma^0(s)$	$\Gamma^1(s)$
-2	\perp	$\Gamma^0(s[x \mapsto -1]) = \perp$
-1	\perp	$\Gamma^0(s[x \mapsto 0]) = \perp$
0	\perp	0
1	\perp	1

Der Fixpunkt bei der Arbeit (I)

```
while (x < 0) {  
  x = x + 1;  
}
```

$$\Gamma(f)(\sigma) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} \sigma & \sigma(x) \geq 0 \\ f(\sigma[x \mapsto \sigma(x) + 1]) & \sigma(x) < 0 \end{cases}$$

Wir betrachten den Zustand $s = \langle x \mapsto ? \rangle$ (nur eine Variable):

s	$\Gamma^0(s)$	$\Gamma^1(s)$	$\Gamma^2(s)$
-2	\perp	$\Gamma^0(s[x \mapsto -1]) = \perp$	$\Gamma^1(s[x \mapsto -1]) = \perp$
-1	\perp	$\Gamma^0(s[x \mapsto 0]) = \perp$	$\Gamma^1(s[x \mapsto 0]) = 0$
0	\perp	0	0
1	\perp	1	1

Der Fixpunkt bei der Arbeit (I)

```
while (x < 0) {  
  x = x + 1;  
}
```

$$\Gamma(f)(\sigma) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} \sigma & \sigma(x) \geq 0 \\ f(\sigma[x \mapsto \sigma(x) + 1]) & \sigma(x) < 0 \end{cases}$$

Wir betrachten den Zustand $s = \langle x \mapsto ? \rangle$ (nur eine Variable):

s	$\Gamma^0(s)$	$\Gamma^1(s)$	$\Gamma^2(s)$	$\Gamma^3(s)$
-2	\perp	$\Gamma^0(s[x \mapsto -1]) = \perp$	$\Gamma^1(s[x \mapsto -1]) = \perp$	$\Gamma^2(s[x \mapsto -1]) = 0$
-1	\perp	$\Gamma^0(s[x \mapsto 0]) = \perp$	$\Gamma^1(s[x \mapsto 0]) = 0$	$\Gamma^2(s[x \mapsto 0]) = 0$
0	\perp	0	0	0
1	\perp	1	1	1

Der Fixpunkt bei der Arbeit (II)

```
x = 0;  
while (n > 0) {  
  x = x + n;  
  n = n - 1;  
}
```

$$\Gamma(f)(\sigma) = \begin{cases} \sigma & \sigma(n) \leq 0 \\ f(\sigma[x \mapsto \sigma(x) + \sigma(n)][n \mapsto \sigma(n) - 1]) & \sigma(n) > 0 \end{cases}$$

Wir betrachten Zustände $s = \langle x \mapsto ?, n \mapsto ? \rangle$ (zwei Variablen).

Der Wert von x im Initialzustand ist dabei unerheblich:

s
 n
-1
0
1
2
3
4

Der Fixpunkt bei der Arbeit (II)

```
x = 0;  
while (n > 0) {  
  x = x + n;  
  n = n - 1;  
}
```

$$\Gamma(f)(\sigma) = \begin{cases} \sigma & \sigma(n) \leq 0 \\ f(\sigma[x \mapsto \sigma(x) + \sigma(n)][n \mapsto \sigma(n) - 1]) & \sigma(n) > 0 \end{cases}$$

Wir betrachten Zustände $s = \langle x \mapsto?, n \mapsto? \rangle$ (zwei Variablen).

Der Wert von x im Initialzustand ist dabei unerheblich:

s	$\Gamma^0(s)$	
n	x	n
-1	\perp	\perp
0	\perp	\perp
1	\perp	\perp
2	\perp	\perp
3	\perp	\perp
4	\perp	\perp

Der Fixpunkt bei der Arbeit (II)

```
x = 0;  
while (n > 0) {  
  x = x + n;  
  n = n - 1;  
}
```

$$\Gamma(f)(\sigma) = \begin{cases} \sigma & \sigma(n) \leq 0 \\ f(\sigma[x \mapsto \sigma(x) + \sigma(n)][n \mapsto \sigma(n) - 1]) & \sigma(n) > 0 \end{cases}$$

Wir betrachten Zustände $s = \langle x \mapsto ?, n \mapsto ? \rangle$ (zwei Variablen).

Der Wert von x im Initialzustand ist dabei unerheblich:

s	$\Gamma^0(s)$		$\Gamma^1(s)$	
	x	n	x	n
-1	\perp	\perp	0	-1
0	\perp	\perp	0	0
1	\perp	\perp	\perp	\perp
2	\perp	\perp	\perp	\perp
3	\perp	\perp	\perp	\perp
4	\perp	\perp	\perp	\perp

Der Fixpunkt bei der Arbeit (II)

```
x= 0;  
while (n > 0) {  
  x= x+n;  
  n= n-1;  
}
```

$$\Gamma(f)(\sigma) = \begin{cases} \sigma & \sigma(n) \leq 0 \\ f(\sigma[x \mapsto \sigma(x) + \sigma(n)][n \mapsto \sigma(n) - 1]) & \sigma(n) > 0 \end{cases}$$

Wir betrachten Zustände $s = \langle x \mapsto?, n \mapsto? \rangle$ (zwei Variablen).

Der Wert von x im Initialzustand ist dabei unerheblich:

s	$\Gamma^0(s)$		$\Gamma^1(s)$		$\Gamma^2(s)$	
n	x	n	x	n	x	n
-1	\perp	\perp	0	-1	0	-1
0	\perp	\perp	0	0	0	0
1	\perp	\perp	\perp	\perp	1	0
2	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp
3	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp
4	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp

Der Fixpunkt bei der Arbeit (II)

```
x= 0;
while (n > 0) {
  x= x+n;
  n= n-1;
}
```

$$\Gamma(f)(\sigma) = \begin{cases} \sigma & \sigma(n) \leq 0 \\ f(\sigma[x \mapsto \sigma(x) + \sigma(n)][n \mapsto \sigma(n) - 1]) & \sigma(n) > 0 \end{cases}$$

Wir betrachten Zustände $s = \langle x \mapsto?, n \mapsto? \rangle$ (zwei Variablen).

Der Wert von x im Initialzustand ist dabei unerheblich:

s	$\Gamma^0(s)$		$\Gamma^1(s)$		$\Gamma^2(s)$		$\Gamma^3(s)$	
	x	n	x	n	x	n	x	n
-1	\perp	\perp	0	-1	0	-1	0	-1
0	\perp	\perp	0	0	0	0	0	0
1	\perp	\perp	\perp	\perp	1	0	1	0
2	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	3	0
3	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp
4	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp

Der Fixpunkt bei der Arbeit (II)

```
x= 0;
while (n > 0) {
  x= x+n;
  n= n-1;
}
```

$$\Gamma(f)(\sigma) = \begin{cases} \sigma & \sigma(n) \leq 0 \\ f(\sigma[x \mapsto \sigma(x) + \sigma(n)][n \mapsto \sigma(n) - 1]) & \sigma(n) > 0 \end{cases}$$

Wir betrachten Zustände $s = \langle x \mapsto?, n \mapsto? \rangle$ (zwei Variablen).

Der Wert von x im Initialzustand ist dabei unerheblich:

s	$\Gamma^0(s)$		$\Gamma^1(s)$		$\Gamma^2(s)$		$\Gamma^3(s)$		$\Gamma^4(s)$	
	x	n	x	n	x	n	x	n	x	n
-1	\perp	\perp	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1
0	\perp	\perp	0	0	0	0	0	0	0	0
1	\perp	\perp	\perp	\perp	1	0	1	0	1	0
2	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	3	0	3	0
3	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	6	0
4	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp

Der Fixpunkt bei der Arbeit (II)

```
x= 0;
while (n > 0) {
  x= x+n;
  n= n-1;
}
```

$$\Gamma(f)(\sigma) = \begin{cases} \sigma & \sigma(n) \leq 0 \\ f(\sigma[x \mapsto \sigma(x) + \sigma(n)][n \mapsto \sigma(n) - 1]) & \sigma(n) > 0 \end{cases}$$

Wir betrachten Zustände $s = \langle x \mapsto?, n \mapsto? \rangle$ (zwei Variablen).

Der Wert von x im Initialzustand ist dabei unerheblich:

s	$\Gamma^0(s)$		$\Gamma^1(s)$		$\Gamma^2(s)$		$\Gamma^3(s)$		$\Gamma^4(s)$		$\Gamma^5(s)$	
	x	n	x	n	x	n	x	n	x	n	x	n
-1	\perp	\perp	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1
0	\perp	\perp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	\perp	\perp	\perp	\perp	1	0	1	0	1	0	1	0
2	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	3	0	3	0	3	0
3	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	6	0	6	0
4	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	10	0

Der Fixpunkt bei der Arbeit (III)

Kleine Änderung im Beispielprogramm:

```
x= 0;  
while (n != 0) {  
  x= x+n;  
  n= n-1;  
}
```

$$\Gamma(f)(\sigma) = \begin{cases} \sigma & \sigma(n) = 0 \\ f(\sigma[x \mapsto \sigma(x) + \sigma(n)][n \mapsto \sigma(n) - 1]) & \text{sonst} \end{cases}$$

Jetzt ergibt sich:

s
n
-2
-1
0
1
2
3

Der Fixpunkt bei der Arbeit (III)

Kleine Änderung im Beispielprogramm:

```
x= 0;  
while (n != 0) {  
  x= x+n;  
  n= n-1;  
}
```

$$\Gamma(f)(\sigma) = \begin{cases} \sigma & \sigma(n) = 0 \\ f(\sigma[x \mapsto \sigma(x) + \sigma(n)][n \mapsto \sigma(n) - 1]) & \text{sonst} \end{cases}$$

Jetzt ergibt sich:

s	$\Gamma^0(s)$	
n	x	n
-2	\perp	\perp
-1	\perp	\perp
0	\perp	\perp
1	\perp	\perp
2	\perp	\perp
3	\perp	\perp

Der Fixpunkt bei der Arbeit (III)

Kleine Änderung im Beispielprogramm:

```
x= 0;  
while (n != 0) {  
  x= x+n;  
  n= n-1;  
}
```

$$\Gamma(f)(\sigma) = \begin{cases} \sigma & \sigma(n) = 0 \\ f(\sigma[x \mapsto \sigma(x) + \sigma(n)][n \mapsto \sigma(n) - 1]) & \text{sonst} \end{cases}$$

Jetzt ergibt sich:

s	$\Gamma^0(s)$		$\Gamma^1(s)$	
	x	n	x	n
-2	\perp	\perp	\perp	\perp
-1	\perp	\perp	\perp	\perp
0	\perp	\perp	0	0
1	\perp	\perp	\perp	\perp
2	\perp	\perp	\perp	\perp
3	\perp	\perp	\perp	\perp

Der Fixpunkt bei der Arbeit (III)

Kleine Änderung im Beispielprogramm:

```
x= 0;  
while (n != 0) {  
  x= x+n;  
  n= n-1;  
}
```

$$\Gamma(f)(\sigma) = \begin{cases} \sigma & \sigma(n) = 0 \\ f(\sigma[x \mapsto \sigma(x) + \sigma(n)][n \mapsto \sigma(n) - 1]) & \text{sonst} \end{cases}$$

Jetzt ergibt sich:

s	$\Gamma^0(s)$		$\Gamma^1(s)$		$\Gamma^2(s)$	
	x	n	x	n	x	n
-2	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp
-1	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp
0	\perp	\perp	0	0	0	0
1	\perp	\perp	\perp	\perp	1	0
2	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp
3	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp

Der Fixpunkt bei der Arbeit (III)

Kleine Änderung im Beispielprogramm:

```
x= 0;  
while (n != 0) {  
  x= x+n;  
  n= n-1;  
}
```

$$\Gamma(f)(\sigma) = \begin{cases} \sigma & \sigma(n) = 0 \\ f(\sigma[x \mapsto \sigma(x) + \sigma(n)][n \mapsto \sigma(n) - 1]) & \text{sonst} \end{cases}$$

Jetzt ergibt sich:

s	$\Gamma^0(s)$		$\Gamma^1(s)$		$\Gamma^2(s)$		$\Gamma^3(s)$	
	x	n	x	n	x	n	x	n
-2	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp
-1	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp
0	\perp	\perp	0	0	0	0	0	0
1	\perp	\perp	\perp	\perp	1	0	1	0
2	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	3	0
3	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp

Der Fixpunkt bei der Arbeit (III)

Kleine Änderung im Beispielprogramm:

```
x= 0;  
while (n != 0) {  
  x= x+n;  
  n= n-1;  
}
```

$$\Gamma(f)(\sigma) = \begin{cases} \sigma & \sigma(n) = 0 \\ f(\sigma[x \mapsto \sigma(x) + \sigma(n)][n \mapsto \sigma(n) - 1]) & \text{sonst} \end{cases}$$

Jetzt ergibt sich:

s	$\Gamma^0(s)$		$\Gamma^1(s)$		$\Gamma^2(s)$		$\Gamma^3(s)$		$\Gamma^4(s)$	
n	x	n	x	n	x	n	x	n	x	n
-2	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp
-1	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp
0	\perp	\perp	0	0	0	0	0	0	0	0
1	\perp	\perp	\perp	\perp	1	0	1	0	1	0
2	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	3	0	3	0
3	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	6	0

Der Fixpunkt bei der Arbeit (IV)

```
while (1) {  
  x = x + 1;  
}
```

$$\Gamma(f)(\sigma) \stackrel{\text{def}}{=} f(\sigma[x \mapsto \sigma(x) + 1])$$

Jetzt ergibt sich:

s
-2
-1
0
1
2
3

Der Fixpunkt bei der Arbeit (IV)

```
while (1) {  
  x = x + 1;  
}
```

$$\Gamma(f)(\sigma) \stackrel{\text{def}}{=} f(\sigma[x \mapsto \sigma(x) + 1])$$

Jetzt ergibt sich:

s	$\Gamma^0(s)$
-2	\perp
-1	\perp
0	\perp
1	\perp
2	\perp
3	\perp

Der Fixpunkt bei der Arbeit (IV)

```
while (1) {  
  x = x + 1;  
}
```

$$\Gamma(f)(\sigma) \stackrel{\text{def}}{=} f(\sigma[x \mapsto \sigma(x) + 1])$$

Jetzt ergibt sich:

s	$\Gamma^0(s)$	$\Gamma^1(s)$
-2	\perp	\perp
-1	\perp	\perp
0	\perp	\perp
1	\perp	\perp
2	\perp	\perp
3	\perp	\perp

Der Fixpunkt bei der Arbeit (IV)

```
while (1) {  
  x = x + 1;  
}
```

$$\Gamma(f)(\sigma) \stackrel{\text{def}}{=} f(\sigma[x \mapsto \sigma(x) + 1])$$

Jetzt ergibt sich:

s	$\Gamma^0(s)$	$\Gamma^1(s)$	$\Gamma^2(s)$
-2	\perp	\perp	\perp
-1	\perp	\perp	\perp
0	\perp	\perp	\perp
1	\perp	\perp	\perp
2	\perp	\perp	\perp
3	\perp	\perp	\perp

Der Fixpunkt bei der Arbeit (IV)

```
while (1) {  
  x = x + 1;  
}
```

$$\Gamma(f)(\sigma) \stackrel{\text{def}}{=} f(\sigma[x \mapsto \sigma(x) + 1])$$

Jetzt ergibt sich:

s	$\Gamma^0(s)$	$\Gamma^1(s)$	$\Gamma^2(s)$	$\Gamma^3(s)$
-2	\perp	\perp	\perp	\perp
-1	\perp	\perp	\perp	\perp
0	\perp	\perp	\perp	\perp
1	\perp	\perp	\perp	\perp
2	\perp	\perp	\perp	\perp
3	\perp	\perp	\perp	\perp

Arbeitsblatt 3.5: Semantik III

Wir betrachten das Beispielprogramm:

```
x= 1;
while (n > 0) {
  x= x*n;
  n= n-1;
}
```

Berechnen Sie wie oben den Fixpunkt:

s	G^0	G^1	G^2	G^3	G^4	
n	x	n	x	n	x	n
0						
1						
2						
3						

Arbeitsblatt 3.5: Semantik III

Wir betrachten das Beispielprogramm:

```
x= 1;  
while (n > 0) {  
    x= x*n;  
    n= n-1;  
}
```

Der Fixpunkt bei der Arbeit (V)

```
x= 0;  
i= 0;  
while (i<=n) {  
  x= x+i;  
  i= i+1;  
}
```

$$\Gamma(f)(\sigma) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} \sigma & \sigma(i) > \sigma(n) \\ f(\sigma[x \mapsto \sigma(x) + \sigma(i)][i \mapsto \sigma(i) + 1]) & \text{sonst} \end{cases}$$

Wir betrachten nur die **while**-Schleife
mit $s = \langle n \mapsto ?, i \mapsto ?, x \mapsto ? \rangle$.

s		$\Gamma^0(s)$		
n	i	n	i	x
0	0	\perp	\perp	\perp
0	1	\perp	\perp	\perp
1	0	\perp	\perp	\perp
1	1	\perp	\perp	\perp
1	2	\perp	\perp	\perp
2	0	\perp	\perp	\perp
2	1	\perp	\perp	\perp
2	2	\perp	\perp	\perp
2	3	\perp	\perp	\perp

Der Fixpunkt bei der Arbeit (V)

```
x = 0;  
i = 0;  
while (i <= n) {  
  x = x + i;  
  i = i + 1;  
}
```

$$\Gamma(f)(\sigma) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} \sigma & \sigma(i) > \sigma(n) \\ f(\sigma[x \mapsto \sigma(x) + \sigma(i)][i \mapsto \sigma(i) + 1]) & \text{sonst} \end{cases}$$

Wir betrachten nur die **while**-Schleife
mit $s = \langle n \mapsto ?, i \mapsto ?, x \mapsto ? \rangle$.

s		$\Gamma^0(s)$		
n	i	n	i	x
0	0	\perp	\perp	\perp
0	1	\perp	\perp	\perp
1	0	\perp	\perp	\perp
1	1	\perp	\perp	\perp
1	2	\perp	\perp	\perp
2	0	\perp	\perp	\perp
2	1	\perp	\perp	\perp
2	2	\perp	\perp	\perp
2	3	\perp	\perp	\perp

Der Fixpunkt bei der Arbeit (V)

```
x= 0;
i= 0;
while (i<=n) {
  x= x+i;
  i= i+1;
}
```

$$\Gamma(f)(\sigma) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} \sigma & \sigma(i) > \sigma(n) \\ f(\sigma[x \mapsto \sigma(x) + \sigma(i)][i \mapsto \sigma(i) + 1]) & \text{sonst} \end{cases}$$

Wir betrachten nur die **while**-Schleife
mit $s = \langle n \mapsto?, i \mapsto?, x \mapsto? \rangle$.

s		$\Gamma^0(s)$			$\Gamma^1(s)$		
n	i	n	i	x	n	i	x
0	0	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥
0	1	⊥	⊥	⊥	0	1	x
1	0	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥
1	1	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥
1	2	⊥	⊥	⊥	1	2	x
2	0	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥
2	1	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥
2	2	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥
2	3	⊥	⊥	⊥	2	3	x

Der Fixpunkt bei der Arbeit (V)

```

x= 0;
i= 0;
while (i<=n) {
  x= x+i;
  i= i+1;
}
    
```

$$\Gamma(f)(\sigma) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} \sigma & \sigma(i) > \sigma(n) \\ f(\sigma[x \mapsto \sigma(x) + \sigma(i)][i \mapsto \sigma(i) + 1]) & \text{sonst} \end{cases}$$

Wir betrachten nur die **while**-Schleife mit $s = \langle n \mapsto ?, i \mapsto ?, x \mapsto ? \rangle$.

s		$\Gamma^0(s)$			$\Gamma^1(s)$			$\Gamma^2(s)$		
n	i	n	i	x	n	i	x	n	i	x
0	0	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	0	1	x
0	1	⊥	⊥	⊥	0	1	x	0	1	x
1	0	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥
1	1	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	1	2	$x + 1$
1	2	⊥	⊥	⊥	1	2	x	1	2	x
2	0	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥
2	1	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥
2	2	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	2	3	$x + 2$
2	3	⊥	⊥	⊥	2	3	x	2	3	x

Der Fixpunkt bei der Arbeit (V)

```
x = 0;
i = 0;
while (i <= n) {
  x = x + i;
  i = i + 1;
}
```

$$\Gamma(f)(\sigma) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} \sigma & \sigma(i) > \sigma(n) \\ f(\sigma[x \mapsto \sigma(x) + \sigma(i)][i \mapsto \sigma(i) + 1]) & \text{sonst} \end{cases}$$

Wir betrachten nur die **while**-Schleife
mit $s = \langle n \mapsto ?, i \mapsto ?, x \mapsto ? \rangle$.

s		$\Gamma^0(s)$			$\Gamma^1(s)$			$\Gamma^2(s)$			$\Gamma^3(s)$		
n	i	n	i	x	n	i	x	n	i	x	n	i	x
0	0	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	0	1	x	0	1	x
0	1	⊥	⊥	⊥	0	1	x	0	1	x	0	1	x
1	0	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	1	2	$x + 1$
1	1	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	1	2	$x + 1$	1	2	$x + 1$
1	2	⊥	⊥	⊥	1	2	x	1	2	x	1	2	x
2	0	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥
2	1	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	2	3	$x + 3$
2	2	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	2	3	$x + 2$	2	3	$x + 2$
2	3	⊥	⊥	⊥	2	3	x	2	3	x	2	3	x

Der Fixpunkt bei der Arbeit (V)

```
x= 0;
i= 0;
while (i<=n) {
  x= x+i;
  i= i+1;
}
```

$$\Gamma(f)(\sigma) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} \sigma & \sigma(i) > \sigma(n) \\ f(\sigma[x \mapsto \sigma(x) + \sigma(i)][i \mapsto \sigma(i) + 1]) & \text{sonst} \end{cases}$$

Wir betrachten nur die **while**-Schleife
mit $s = \langle n \mapsto ?, i \mapsto ?, x \mapsto ? \rangle$.

s		$\Gamma^0(s)$			$\Gamma^1(s)$			$\Gamma^2(s)$			$\Gamma^3(s)$			$\Gamma^4(s)$		
n	i	n	i	x	n	i	x	n	i	x	n	i	x	n	i	x
0	0	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	0	1	x	0	1	x	0	1	x
0	1	⊥	⊥	⊥	0	1	x	0	1	x	0	1	x	0	1	x
1	0	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	1	2	$x+1$	1	2	$x+1$
1	1	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	1	2	$x+1$	1	2	$x+1$	1	2	$x+1$
1	2	⊥	⊥	⊥	1	2	x	1	2	x	1	2	x	1	2	x
2	0	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	2	3	$x+3$
2	1	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	2	3	$x+3$	2	3	$x+3$
2	2	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	2	3	$x+2$	2	3	$x+2$	2	3	$x+2$
2	3	⊥	⊥	⊥	2	3	x	2	3	x	2	3	x	2	3	x

Weitere Eigenschaften der denotationalen Semantik

Lemma (Partielle Funktion)

$\llbracket - \rrbracket_c$ ist rechtseindeutig und damit eine **partielle Funktion**.

- ▶ Beweis über strukturelle Induktion über $c \in \mathbf{Stmt}$ und über **Fixpunktinduktion**:
 - ▶ Zu zeigen: wenn s rechtseindeutig, dann ist $\Gamma(s)$ rechtseindeutig
 - ▶ Dann ist $\text{fix}(\Gamma)$ rechtseindeutig.
- ▶ Eigenschaften der Iteration:
 - ▶ Sei $w \equiv \mathbf{while} (b) c$
 - ▶ Dann

$$\llbracket w \rrbracket_c = \llbracket \mathbf{if} (b) \{c; w\} \mathbf{else} \{ \} \rrbracket_c \quad (1)$$

$$(\sigma, \sigma') \in \llbracket w \rrbracket_c \implies (\sigma', \text{false}) \in \llbracket b \rrbracket_B \quad (2)$$

Beweis (1)

$$\llbracket w \rrbracket_c = \text{fix}(\Gamma)$$

Note

$$\text{fix}(\Gamma) = \Gamma(\text{fix}(\Gamma))$$

Beweis (1)

$$\begin{aligned} \llbracket w \rrbracket_c &= \text{fix}(\Gamma) \\ &= \Gamma(\text{fix}(\Gamma)) \end{aligned}$$

Note

$$\text{fix}(\Gamma) = \Gamma(\text{fix}(\Gamma))$$

Beweis (1)

$$\begin{aligned}\llbracket w \rrbracket_c &= \text{fix}(\Gamma) \\ &= \Gamma(\text{fix}(\Gamma)) \\ &= \Gamma(\llbracket w \rrbracket_c)\end{aligned}$$

Note

$$\begin{aligned}\Gamma(s) = & \{(\sigma, \sigma') \mid (\sigma, \text{true}) \in \llbracket b \rrbracket_B \wedge (\sigma, \sigma') \in \llbracket c \rrbracket_c \circ s\} \\ & \cup \{(\sigma, \sigma) \mid (\sigma, \text{false}) \in \llbracket b \rrbracket_B\}\end{aligned}$$

Beweis (1)

$$\begin{aligned} \llbracket w \rrbracket_c &= \text{fix}(\Gamma) \\ &= \Gamma(\text{fix}(\Gamma)) \\ &= \Gamma(\llbracket w \rrbracket_c) \\ &= \{(\sigma, \sigma') \mid (\sigma, \text{true}) \in \llbracket b \rrbracket_B \wedge (\sigma, \sigma') \in \llbracket c \rrbracket_c \circ \llbracket w \rrbracket_c\} \\ &\quad \cup \{(\sigma, \sigma) \mid (\sigma, \text{false}) \in \llbracket b \rrbracket_B\} \end{aligned}$$

Note

$$\begin{aligned} \Gamma(s) &= \{(\sigma, \sigma') \mid (\sigma, \text{true}) \in \llbracket b \rrbracket_B \wedge (\sigma, \sigma') \in \llbracket c \rrbracket_c \circ s\} \\ &\quad \cup \{(\sigma, \sigma) \mid (\sigma, \text{false}) \in \llbracket b \rrbracket_B\} \end{aligned}$$

Beweis (1)

$$\begin{aligned} \llbracket w \rrbracket_c &= \text{fix}(\Gamma) \\ &= \Gamma(\text{fix}(\Gamma)) \\ &= \Gamma(\llbracket w \rrbracket_c) \\ &= \{(\sigma, \sigma') \mid (\sigma, \text{true}) \in \llbracket b \rrbracket_B \wedge (\sigma, \sigma') \in \llbracket c \rrbracket_c \circ \llbracket w \rrbracket_c\} \\ &\quad \cup \{(\sigma, \sigma) \mid (\sigma, \text{false}) \in \llbracket b \rrbracket_B\} \end{aligned}$$

Note

Beweis (1)

$$\begin{aligned} \llbracket w \rrbracket_c &= \text{fix}(\Gamma) \\ &= \Gamma(\text{fix}(\Gamma)) \\ &= \Gamma(\llbracket w \rrbracket_c) \\ &= \{(\sigma, \sigma') \mid (\sigma, \text{true}) \in \llbracket b \rrbracket_B \wedge (\sigma, \sigma') \in \llbracket c \rrbracket_c \circ \llbracket w \rrbracket_c\} \\ &\quad \cup \{(\sigma, \sigma) \mid (\sigma, \text{false}) \in \llbracket b \rrbracket_B\} \\ &= \{(\sigma, \sigma') \mid (\sigma, \text{true}) \in \llbracket b \rrbracket_B \wedge (\sigma, \sigma') \in \llbracket c; w \rrbracket_c\} \\ &\quad \cup \{(\sigma, \sigma) \mid (\sigma, \text{false}) \in \llbracket b \rrbracket_B \wedge (\sigma, \sigma) \in \llbracket \{\} \rrbracket_c\} \end{aligned}$$

Note

$$\llbracket \text{if } (b) \ c_0 \ \text{else } c_1 \rrbracket_c = \{(\sigma, \sigma') \mid (\sigma, \text{true}) \in \llbracket b \rrbracket_B \wedge (\sigma, \sigma') \in \llbracket c_0 \rrbracket_c\} \\ \cup \{(\sigma, \sigma') \mid (\sigma, \text{false}) \in \llbracket b \rrbracket_B \wedge (\sigma, \sigma') \in \llbracket c_1 \rrbracket_c\}$$

Beweis (1)

$$\begin{aligned} \llbracket w \rrbracket_c &= \text{fix}(\Gamma) \\ &= \Gamma(\text{fix}(\Gamma)) \\ &= \Gamma(\llbracket w \rrbracket_c) \\ &= \{(\sigma, \sigma') \mid (\sigma, \text{true}) \in \llbracket b \rrbracket_B \wedge (\sigma, \sigma') \in \llbracket c \rrbracket_c \circ \llbracket w \rrbracket_c\} \\ &\quad \cup \{(\sigma, \sigma) \mid (\sigma, \text{false}) \in \llbracket b \rrbracket_B\} \\ &= \{(\sigma, \sigma') \mid (\sigma, \text{true}) \in \llbracket b \rrbracket_B \wedge (\sigma, \sigma') \in \llbracket c; w \rrbracket_c\} \\ &\quad \cup \{(\sigma, \sigma) \mid (\sigma, \text{false}) \in \llbracket b \rrbracket_B \wedge (\sigma, \sigma) \in \llbracket \{\} \rrbracket_c\} \\ &= \llbracket \text{if } (b) \{c; w\} \text{ else } \{\} \rrbracket_c \end{aligned}$$

Note

$$\llbracket \text{if } (b) \ c_0 \ \text{else} \ c_1 \rrbracket_c = \{(\sigma, \sigma') \mid (\sigma, \text{true}) \in \llbracket b \rrbracket_B \wedge (\sigma, \sigma') \in \llbracket c_0 \rrbracket_c\} \\ \cup \{(\sigma, \sigma') \mid (\sigma, \text{false}) \in \llbracket b \rrbracket_B \wedge (\sigma, \sigma') \in \llbracket c_1 \rrbracket_c\}$$

Zusammenfassung

- ▶ Die denotationale Semantik bildet Programme (Ausdrücke) auf **partielle Funktionen** $\Sigma \rightarrow \Sigma$ ab.
- ▶ Zentral ist der Begriff des **kleinsten Fixpunktes**, der die Semantik der while-Schleife bildet.
- ▶ undefiniertheit wird **implizit** behandelt (durch die Partialität von $\Sigma \rightarrow \Sigma$).
 - ▶ Nicht-Termination und undefiniertheit sind semantisch äquivalent.
- ▶ Genaues Verhältnis zur **operationalen Semantik?**

Nächste Vorlesung